

ファモチジン錠 10/20/細粒 2%/散 10%「サワイ」、 ファモチジン D 錠 10mg/20mg「サワイ」に関する Q&A

2025 年 6 月作成

■ご利用にあたっての注意■

- 本 Q&A は、医療機関の先生方からよく寄せられる『ファモチジン錠 10/20「サワイ」、ファモチジン細粒 2%「サワイ」、ファモチジン散 10%「サワイ」、ファモチジン D 錠 10mg/20mg「サワイ」』に関する質問事項をとりまとめたものです。
- 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。
- 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。
- なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。

■ 質問と回答 ■

Q	ファモチジン錠 10/20/細粒 2%/散 10%「サワイ」、ファモチジン D 錠 10mg/20mg「サワイ」の 一包化について
A	ファモチジン錠 10/20/細粒 2%/散 10%「サワイ」、ファモチジン D 錠 10mg/20mg「サワイ」の一包化については、参考に無包装下の安定性をご案内しています。 無包装下の安定性データは、以下のページに記載しております。 一包化については、データより医療機関の先生方のご判断のもとに行っていただきますようお願いいたします。 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> ファモチジン錠 10「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> ファモチジン錠 20「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> ファモチジン細粒 2%「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> ファモチジン散 10%「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> ファモチジン D 錠 10mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> ファモチジン D 錠 20mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 [引用資料] ファモチジン D 錠 10mg/20mg「サワイ」 電子添文 2023 年 10 月改訂（第 1 版） 《電子添文の内容》 20. 取扱い上の注意(ファモチジン D 錠 10mg/20mg「サワイ」) 開封後は湿気を避けて保存すること。 ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL : 0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文]ファモチジン錠 10/20/細粒 2%/散 10%「サワイ」: https://med.sawai.co.jp/file/pr1_177.pdf ファモチジン D 錠 10mg/20mg「サワイ」: https://med.sawai.co.jp/file/pr1_1102.pdf

Q	ファモチジン錠 10/20/細粒 2%/散 10%「サワイ」、ファモチジン D 錠 10mg/20mg「サワイ」の 腎機能障害患者への投与について																				
A	ファモチジンは主として腎臓から未変化体で排泄されます。 腎機能低下患者にファモチジンを投与すると、腎機能の低下とともに血中未変化体濃度が上昇し、尿中排泄が減少するので、次のような投与法を目安としてください。 1回20mg1日2回投与を基準とする場合 <table border="1"> <thead> <tr> <th>クレアチニンクリアランス (mL/min)</th><th>投与法</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ccr$\geq$60</td><td>1回20mg 1日2回</td></tr> <tr> <td>60>Ccr$\geq$30</td><td>1回20mg 1日1回 1回10mg 1日2回</td></tr> <tr> <td>30$\geq$Ccr</td><td>1回20mg 2～3日に1回 1回10mg 1日1回</td></tr> <tr> <td>透析患者</td><td>1回20mg 透析後1回 1回10mg 1日1回</td></tr> </tbody> </table> [引用資料] ファモチジン錠 10/20/細粒 2%/散 10%「サワイ」 電子添文 2023 年 10 月改訂（第 1 版） ファモチジン D 錠 10mg/20mg「サワイ」 電子添文 2023 年 10 月改訂（第 1 版） 《電子添文の内容》 7. 用法及び用量に関連する注意 7.1 腎機能低下患者への投与法 ファモチジンは主として腎臓から未変化体で排泄される。腎機能低下患者にファモチジンを投与すると、腎機能の低下とともに血中未変化体濃度が上昇し、尿中排泄が減少するので、次のような投与法を目安とする¹⁾。 1回20mg1日2回投与を基準とする場合 <table border="1"> <thead> <tr> <th>クレアチニンクリアランス (mL/min)</th><th>投与法</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ccr$\geq$60</td><td>1回20mg 1日2回</td></tr> <tr> <td>60>Ccr$\geq$30</td><td>1回20mg 1日1回 1回10mg 1日2回</td></tr> <tr> <td>30$\geq$Ccr</td><td>1回20mg 2～3日に1回 1回10mg 1日1回</td></tr> <tr> <td>透析患者</td><td>1回20mg 透析後1回 1回10mg 1日1回</td></tr> </tbody> </table> 1) 猪爪信夫他：Prog. Med., 1996 ; 16（11）：2897-2903 9. 特定の背景を有する患者に関する注意 9.2 腎機能障害患者 血中濃度が持続するので、投与量を減ずるか投与間隔をあけて使用すること。	クレアチニンクリアランス (mL/min)	投与法	Ccr $\geq$ 60	1回20mg 1日2回	60>Ccr $\geq$ 30	1回20mg 1日1回 1回10mg 1日2回	30 $\geq$ Ccr	1回20mg 2～3日に1回 1回10mg 1日1回	透析患者	1回20mg 透析後1回 1回10mg 1日1回	クレアチニンクリアランス (mL/min)	投与法	Ccr $\geq$ 60	1回20mg 1日2回	60>Ccr $\geq$ 30	1回20mg 1日1回 1回10mg 1日2回	30 $\geq$ Ccr	1回20mg 2～3日に1回 1回10mg 1日1回	透析患者	1回20mg 透析後1回 1回10mg 1日1回
クレアチニンクリアランス (mL/min)	投与法																				
Ccr $\geq$ 60	1回20mg 1日2回																				
60>Ccr $\geq$ 30	1回20mg 1日1回 1回10mg 1日2回																				
30 $\geq$ Ccr	1回20mg 2～3日に1回 1回10mg 1日1回																				
透析患者	1回20mg 透析後1回 1回10mg 1日1回																				
クレアチニンクリアランス (mL/min)	投与法																				
Ccr $\geq$ 60	1回20mg 1日2回																				
60>Ccr $\geq$ 30	1回20mg 1日1回 1回10mg 1日2回																				
30 $\geq$ Ccr	1回20mg 2～3日に1回 1回10mg 1日1回																				
透析患者	1回20mg 透析後1回 1回10mg 1日1回																				

11. 副作用

11.1 重大な副作用

11.1.7 意識障害、痙攣（いずれも頻度不明）

意識障害、全身痙攣（痙直性、間代性、ミオクローヌス性）があらわれることがある。特に腎機能障害を有する患者においてあらわれやすいので、注意すること。

16. 薬物動態

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 腎機能障害患者

ファモチジン20mg静脈内投与したときのパラメータ¹⁾

平均Ccr値 (mL/min/1.48m ²)		t _{1/2β} (h)	AUC (ng·h/mL)	C _{tot} (mL/min)
98.9	n=7	2.59	857	412
73.8	n=9	2.92	909	381
49.2	n=5	4.72	1424	242
10.3	n=10	12.07	4503	84

1) 猪爪信夫他：Prog. Med., 1996 ; 16 (11) : 2897-2903

- 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。
- 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL : 0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。
- なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。

[電子添文]

ファモチジン錠 10/20/細粒 2%/散 10%「サワイ」 : https://med.sawai.co.jp/file/pr1_177.pdf

ファモチジン D 錠 10mg/20mg「サワイ」 : https://med.sawai.co.jp/file/pr1_1102.pdf