

メトトレキサートカプセル 2mg「サワイ」 に関する Q&A

2026 年 7 月作成

■ご利用にあたっての注意■

- 本 Q&A は、医療機関の先生方からよく寄せられる『メトトレキサートカプセル 2mg「サワイ」』に関する質問事項をとりまとめたものです。
- 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。
- 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。
- なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。

■ 質問と回答 ■

Q	メトトレキサートカプセル 2mg「サワイ」の 一包化について
A	メトトレキサートカプセル 2mg「サワイ」の一包化については、参考は無包装下の安定性をご案内しています。無包装下の安定性データは、以下のページに記載しております。 一包化については、データより医療機関の先生方のご判断のもとに行っていただきますようお願いいたします。 sawai medical site TOP ページ＞ 製品情報＞ 製品情報一覧＞ メトトレキサートカプセル 2mg「サワイ」＞ 添付資料ダウンロード＞ 無包装下安定性 [引用資料] メトトレキサートカプセル 2mg「サワイ」 電子添文 2026 年 3 月改訂（第 2 版） 《電子添文の内容》 20. 取扱い上の注意 アルミピロー包装開封後は、湿気を避けて保存すること。 ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文] メトトレキサートカプセル 2mg「サワイ」： https://med.sawai.co.jp/file/pr1_1117.pdf

Q	メトトレキサートカプセル 2mg「サワイ」の 腎機能障害患者への投与について
A	副作用が強くあらわれるおそれがあるため、腎機能障害患者への投与は禁忌です。 [引用資料] メトトレキサートカプセル 2mg「サワイ」 電子添文 2026 年 3 月改訂（第 2 版） 《電子添文の内容》 1. 警告 1.6 腎機能が低下している場合には副作用が強くあらわれることがあるため、本剤投与開始前及び投与中は腎機能検査を行うなど、患者の状態を十分観察すること。 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 2.5 腎障害のある患者 9. 特定の背景を有する患者に関する注意 9.2 腎機能障害患者 投与しないこと。副作用が強くあらわれるおそれがある。 ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文] メトトレキサートカプセル 2mg「サワイ」： https://med.sawai.co.jp/file/pr1_1117.pdf