

イコサペント酸エチルカプセル 300mg「サワイ」 イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg/600mg/900mg「サワイ」 に関する Q&A

2026 年 8 月作成

■ご利用にあたっての注意■

- 本 Q&A は、医療機関の先生方からよく寄せられる『イコサペント酸エチルカプセル 300mg「サワイ」、イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg/600mg/900mg「サワイ」』に関する質問事項をとりまとめたものです。
- 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。
- 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。
- なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。

■ 質問と回答 ■

Q	イコサペント酸エチルカプセル 300mg「サワイ」、 イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg/600mg/900mg「サワイ」の 一包化について
A	イコサペント酸エチルカプセル 300mg「サワイ」、イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg/600mg/900mg「サワイ」の一包化については、参考は無包装下の安定性をご案内しています。無包装下の安定性データは、以下のページに記載しております。 一包化については、データより医療機関の先生方のご判断のもとに行っていただきますようお願いいたします。 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> イコサペント酸エチルカプセル 300mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> イコサペント酸エチル粒状カプセル 600mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 [引用資料] イコサペント酸エチルカプセル 300mg「サワイ」 電子添文 2024 年 11 月改訂（第 2 版） 《電子添文の内容》 20. 取扱い上の注意 開封後は、高温・湿気・光を避けて保存すること。高温・高湿下ではカプセルが軟化することがある。 ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文] イコサペント酸エチルカプセル 300mg「サワイ」:https://med.sawai.co.jp/file/pr1_40.pdf イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg/600mg/900mg「サワイ」: https://med.sawai.co.jp/file/pr1_1203.pdf

Q	イコサペント酸エチルカプセル 300mg「サワイ」、 イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg/600mg/900mg「サワイ」の 食事の影響について
A	承認されている用法は、閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛および冷感の改善には「1 回 600mg を 1 日 3 回、毎食直後に経口投与」、高脂血症には「1 回 900mg を 1 日 2 回食直後に経口投与」または「1 回 600mg を 1 日 3 回、食直後に経口投与」です。 空腹時に投与すると吸収が悪くなるため、食直後に服用するようご指導ください。 [引用資料] イコサペント酸エチルカプセル 300mg「サワイ」 電子添文 2024 年 11 月改訂（第 2 版） イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg/600mg/900mg「サワイ」 電子添文 2026 年 3 月改訂（第 3 版） 《電子添文の内容》 14. 適用上の注意（イコサペント酸エチルカプセル 300mg「サワイ」） 14.1 薬剤交付時の注意 14.1.2 本剤は空腹時に投与すると吸収が悪くなるので食直後に服用させること。 14. 適用上の注意（イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg/600mg/900mg「サワイ」） 14.1 薬剤交付時の注意 14.1.1 本剤は空腹時に投与すると吸収が悪くなるので食直後に服用させること。 ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL : 0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文] イコサペント酸エチルカプセル 300mg「サワイ」:https://med.sawai.co.jp/file/pr1_40.pdf イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg/600mg/900mg「サワイ」: https://med.sawai.co.jp/file/pr1_1203.pdf