

シロスタゾール錠 50mg/100mg「サワイ」、 シロスタゾール OD 錠 50mg/100mg「サワイ」 に関する Q&A

2026 年 8 月作成

■ご利用にあたっての注意■

- 本 Q&A は、医療機関の先生方からよく寄せられる『シロスタゾール錠 50mg/100mg「サワイ」、シロスタゾール OD 錠 50mg/100mg「サワイ」』に関する質問事項をとりまとめたものです。
- 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。
- 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。
- なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。

■ 質問と回答 ■

Q	シロスタゾール錠 50mg/100mg「サワイ」、シロスタゾール OD 錠 50mg/100mg「サワイ」の 一包化について
A	シロスタゾール錠 50mg/100mg「サワイ」、シロスタゾール OD 錠 50mg/100mg「サワイ」 の一包化については、参考に無包装下の安定性をご案内しています。 無包装下の安定性データは、以下のページに記載しております。 一包化については、データより医療機関の先生方のご判断のもとに行っていただきますようお願いいたします。 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> シロスタゾール錠 50mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> シロスタゾール錠 100mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> シロスタゾール OD 錠 50mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> シロスタゾール OD 錠 100mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 [引用資料] シロスタゾール錠 50mg/100mg「サワイ」、シロスタゾール OD 錠 50mg/100mg「サワイ」 電子添文 2026 年 3 月改訂（第 2 版） 《電子添文の内容》 20. 取扱い上の注意 〈OD 錠〉 開封後は湿気を避けて保存すること。 ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文] シロスタゾール錠 50mg/100mg「サワイ」、シロスタゾール OD 錠 50mg/100mg「サワイ」： https://med.sawai.co.jp/file/pr1_194.pdf

Q	シロスタゾール錠 50mg/100mg「サワイ」、シロスタゾール OD 錠 50mg/100mg「サワイ」の 腎機能障害患者への投与について
A	腎機能障害患者への投与は、腎機能が悪化するおそれがあります。また、シロスタゾールの代謝物の血中濃度の上昇が報告されています。 [引用資料] シロスタゾール錠 50mg/100mg「サワイ」、シロスタゾール OD 錠 50mg/100mg「サワイ」 電子添文 2026 年 3 月改訂（第 2 版） 《電子添文の内容》 9. 特定の背景を有する患者に関する注意 9.2 腎機能障害患者 腎機能が悪化するおそれがある。また、シロスタゾールの代謝物の血中濃度の上昇が報告されている。 16. 薬物動態 16.6 特定の背景を有する患者 16.6.1 腎機能障害患者 重度の腎機能障害被験者（クレアチンクリアランス 5～25mL/min）にシロスタゾール 1 日 100mg を 8 日間連続経口投与した時、健康成人に比べシロスタゾールの C_{max} は 29%、AUC は 39%減少したが、活性代謝物の OPC-13213 の C_{max} は 173%、AUC は 209%増加した。軽度（クレアチンクリアランス 50～89mL/min）及び中等度（クレアチンクリアランス 26～49mL/min）の被験者において差は認められなかった¹⁶⁾（外国人データ）。 16) Mallikaarjun, S. et al. : Clin. Pharmacokinet., 1999 ; 37 (Suppl. 2) : 33-40 ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL : 0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文] シロスタゾール錠 50mg/100mg「サワイ」、シロスタゾール OD 錠 50mg/100mg「サワイ」： https://med.sawai.co.jp/file/pr1_194.pdf