

アリピプラゾール錠 1mg/3mg/6mg/12mg/24mg「サワイ」 アリピプラゾール内用液 1mg/3mg/6mg/12mg 分包「サワイ」に関する Q&A

2025 年 6 月作成

■ご利用にあたっての注意■

- 本 Q&A は、医療機関の先生方からよく寄せられる『アリピプラゾール錠 1mg/3mg/6mg/12mg/24mg 「サワイ」、アリピプラゾール内用液 1mg/3mg/6mg/12mg 分包「サワイ」』に関する質問事項をとりまとめたものです。
- 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。
- 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。
- なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。

■ 質問と回答 ■

Q	アリピプラゾール錠 1mg/3mg/6mg/12mg/24mg「サワイ」の一包化 について
A	アリピプラゾール錠 1mg/3mg/6mg/12mg/24mg「サワイ」の一包化については、参考は無包装下の安定性をご案内しています。 無包装下の安定性データは、以下のページに記載しております。 一包化については、データより医療機関の先生方のご判断のもとに行っていただきますようお願いいたします。 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> アリピプラゾール錠 1mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> アリピプラゾール錠 3mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> アリピプラゾール錠 6mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> アリピプラゾール錠 12mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> アリピプラゾール錠 24mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 [引用資料] アリピプラゾール錠 1mg/3mg/6mg/12mg/24mg「サワイ」 電子添文 2024 年 10 月改訂(第 4 版) 《電子添文の内容》 20. 取扱い上の注意 〈製剤共通〉 20.1 開封後は高温・高湿を避けて保存すること。 〈錠 1mg、錠 3mg、錠 12mg、錠 24mg〉 20.2 錠剤表面に使用色素による斑点がみられることがある。 ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文] アリピプラゾール錠 1mg/3mg/6mg/12mg/24mg「サワイ」：https://med.sawai.co.jp/file/pr1_4571.pdf

Q	アリピプラゾール錠 1mg/3mg/6mg/12mg/24mg「サワイ」、 アリピプラゾール内用液 1mg/3mg/6mg/12mg 分包「サワイ」の食事の影響について
A	承認されている用法は、「1 日 1 回経口投与」もしくは「1 日 1 回又は 2 回に分けて経口投与」であり、空腹時投与、食後投与の指定はございません。 参考として、食事の影響については、電子添文に以下のような記載があります。 [引用資料] アリピプラゾール錠 1mg/3mg/6mg/12mg/24mg「サワイ」 電子添文 2024 年 10 月改訂（第 4 版） アリピプラゾール内用液 1mg/3mg/6mg/12mg 分包「サワイ」 電子添文 2024 年 10 月改訂（第 4 版） 《電子添文の内容》 16. 薬物動態(アリピプラゾール錠 1mg/3mg/6mg/12mg/24mg「サワイ」) 16.2 吸収 16.2.1 食事の影響 健康成人にアリピプラゾール 3mg を空腹時又は食後に単回経口投与した時、アリピプラゾールの Cmax 及び AUC に及ぼす食事の影響は認められなかった⁷⁾。 7) 食事による影響の検討（エビリファイ錠/散：2006 年 1 月 23 日承認、申請資料概要 2.7.6.1） 16. 薬物動態(アリピプラゾール内用液 1mg/3mg/6mg/12mg 分包「サワイ」) 16.2 吸収 16.2.1 食事の影響 健康成人にアリピプラゾール 3mg を空腹時又は食後に単回経口投与した時、アリピプラゾールの Cmax 及び AUC に及ぼす食事の影響は認められなかった⁶⁾。 6) 食事による影響の検討（エビリファイ錠/散：2006 年 1 月 23 日承認、申請資料概要 2.7.6.1） ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文] アリピプラゾール錠 1mg/3mg/6mg/12mg/24mg「サワイ」：https://med.sawai.co.jp/file/pr1_4571.pdf アリピプラゾール内用液 1mg/3mg/6mg/12mg 分包「サワイ」：https://med.sawai.co.jp/file/pr1_4772.pdf

Q	アリピプラゾール錠 1mg/3mg/6mg/12mg/24mg「サワイ」、 アリピプラゾール内用液 1mg/3mg/6mg/12mg 分包「サワイ」の腎機能障害患者への投与について
A	参考として、腎機能障害患者への投与した場合の薬物動態については、電子添文では以下のような記載があります。 [引用資料] アリピプラゾール錠 1mg/3mg/6mg/12mg/24mg「サワイ」 電子添文 2024 年 10 月改訂（第 4 版） アリピプラゾール内用液 1mg/3mg/6mg/12mg 分包「サワイ」 電子添文 2024 年 10 月改訂（第 4 版） 《電子添文の内容》 16. 薬物動態(アリピプラゾール錠 1mg/3mg/6mg/12mg/24mg「サワイ」) 16.6 特定の背景を有する患者 16.6.1 腎機能障害患者 重度の腎機能障害被験者 6 例（クレアチンクリアランス<30mL/min）における試験では、腎機能障害による血中薬物動態への影響は少なかった¹³⁾（外国人データ）。 13) 腎障害患者における薬物動態（エビリファイ錠/散：2006 年 1 月 23 日承認、申請資料概要 2.7.6.3) 16. 薬物動態(アリピプラゾール内用液 1mg/3mg/6mg/12mg 分包「サワイ」) 16.6 特定の背景を有する患者 16.6.1 腎機能障害患者 重度の腎機能障害被験者 6 例（クレアチンクリアランス<30mL/min）における試験では、腎機能障害による血中薬物動態への影響は少なかった¹²⁾（外国人データ）。 12) 腎障害患者における薬物動態（エビリファイ錠/散：2006 年 1 月 23 日承認、申請資料概要 2.7.6.3) ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文] アリピプラゾール錠 1mg/3mg/6mg/12mg/24mg「サワイ」：https://med.sawai.co.jp/file/pr1_4571.pdf アリピプラゾール内用液 1mg/3mg/6mg/12mg 分包「サワイ」：https://med.sawai.co.jp/file/pr1_4772.pdf