

バゼドキシフェン錠 20mg「サワイ」 に関する Q&A

2026 年 8 月作成

■ご利用にあたっての注意■

- 本 Q&A は、医療機関の先生方からよく寄せられる『バゼドキシフェン錠 20mg「サワイ」』に関する質問事項をとりまとめたものです。
- 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。
- 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。
- なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。

■ 質問と回答 ■

Q	バゼドキシフェン錠 20mg「サワイ」の 一包化について
A	バゼドキシフェン錠 20mg「サワイ」の一包化については、参考は無包装下の安定性をご案内しています。無包装下の安定性データは、以下のページに記載しております。 一包化については、データより医療機関の先生方のご判断のもとに行っていただきますようお願いいたします。 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> バゼドキシフェン錠 20mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL : 0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文] バゼドキシフェン錠 20mg「サワイ」: https://med.sawai.co.jp/file/pr1_4695.pdf

Q	バゼドキシフェン錠 20mg「サワイ」の 食事の影響について
A	承認されている用法は、「1 日 1 回経口投与」であり、空腹時投与、食後投与の指定はございません。参考として、食事の影響については、電子添文に以下のような記載があります。 [引用資料] バゼドキシフェン錠 20mg「サワイ」 電子添文 2023 年 12 月改訂（第 1 版） 《電子添文の内容》 16. 薬物動態 16.2 吸収 16.2.1 食事の影響 健康閉経後女性 28 例にバゼドキシフェン 20mg を高脂肪食摂食下で単回経口投与したとき、絶食下投与と比較して C_{max} は 28%、AUC は 22%増加した。また、健康閉経後女性 20 例にバゼドキシフェン 20mg を標準脂肪食下で 7 日間反復経口投与したとき、絶食下投与と比較して、C_{max} は 42%、AUC は 35%増加した⁵⁾（外国人データ）。 5) 生物薬剤学及び関連する分析法（個々の試験結果の要約）（ビビアント錠：2010 年 7 月 23 日承認、申請資料概要 2.7.1.2） ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文] バゼドキシフェン錠 20mg「サワイ」: https://med.sawai.co.jp/file/pr1_4695.pdf