

酢酸亜鉛錠 25mg/50mg「サワイ」 酢酸亜鉛顆粒 5%「サワイ」に関する Q&A

2025 年 6 月作成

■ご利用にあたっての注意■

- 本 Q&A は、医療機関の先生方からよく寄せられる『酢酸亜鉛錠 25mg/50mg「サワイ」、酢酸亜鉛顆粒 5%「サワイ」』に関する質問事項をとりまとめたものです。
- 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。
- 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター(TEL：0120-381-999)または担当 MR までお問い合わせください。
- なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。

■ 質問と回答 ■

Q	酢酸亜鉛錠 25mg/50mg「サワイ」、酢酸亜鉛顆粒 5%「サワイ」の 一包化 について
A	酢酸亜鉛錠 25mg/50mg「サワイ」、酢酸亜鉛顆粒 5%「サワイ」の一包化については、参考に無包装下の安定性をご案内しています。 無包装下の安定性データは、以下のページに記載しております。 一包化については、データより医療機関の先生方のご判断のもとに行っていただきますようお願いいたします。 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> 酢酸亜鉛錠 25mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> 酢酸亜鉛錠 50mg「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 sawai medical site TOP ページ> 製品情報> 製品情報一覧> 酢酸亜鉛顆粒 5%「サワイ」> 添付資料ダウンロード> 無包装下安定性 ● 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。 ● 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター (TEL : 0120-381-999) または担当 MR までお問い合わせください。 ● なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。 [電子添文] 酢酸亜鉛錠 25mg/50mg「サワイ」: https://med.sawai.co.jp/file/pr1_4806.pdf 酢酸亜鉛顆粒 5%「サワイ」: https://med.sawai.co.jp/file/pr1_4823.pdf

Q	酢酸亜鉛錠 25mg/50mg「サワイ」、酢酸亜鉛顆粒 5%「サワイ」の食事の影響について								
A	〈ウィルソン病（肝レンズ核変性症）〉 承認されている用法は、「食前 1 時間以上又は食後 2 時間以上あけて投与」です。 また、食物と同時摂取した場合は、効果が遅延する恐れがありますので、注意してください。 〈低亜鉛血症〉 承認されている用法は、「食後投与」です。 [引用資料] 酢酸亜鉛錠 25mg/50mg「サワイ」 電子添文 2025 年 5 月改訂（第 4 版） 酢酸亜鉛顆粒 5%「サワイ」 電子添文 2025 年 5 月改訂（第 2 版） 《電子添文の内容》 6. 用法及び用量 〈ウィルソン病（肝レンズ核変性症）〉 成人には、亜鉛として、通常 1 回 50mg を 1 日 3 回経口投与する。 なお、年齢、症状に応じて適宜増減するが、最大投与量は 1 日 250mg（1 回 50mg を 1 日 5 回投与）とする。 6 歳以上の小児には、亜鉛として、通常 1 回 25mg を 1 日 3 回経口投与する。 1 歳以上 6 歳未満の小児には、亜鉛として、通常 1 回 25mg を 1 日 2 回経口投与する。 なお、いずれの場合も、食前 1 時間以上又は食後 2 時間以上あけて投与すること。 〈低亜鉛血症〉 通常、成人及び体重 30kg 以上の小児では、亜鉛として、1 回 25～50mg を開始用量とし 1 日 2 回経口投与する。 通常、体重 30kg 未満の小児では、亜鉛として、1 回 0.5～0.75mg/kg を開始用量とし 1 日 2 回経口投与するが、患者の状態により 1 回 25mg の 1 日 1 回経口投与から開始することもできる。 なお、血清亜鉛濃度や患者の状態により適宜増減するが、最大投与量は以下のとおりとする。 <table border="1"> <tr> <th>対象</th><th>最大投与量(1日あたり)</th></tr> <tr> <td>成人及び体重30kg以上の小児</td><td>150mg(1回50mgを1日3回)</td></tr> <tr> <td>体重10kg以上30kg未満の小児</td><td>75mg(1回25mgを1日3回)</td></tr> <tr> <td>体重10kg未満の小児</td><td>25mg(1回12.5mgを1日2回、又は1回25mgを1日1回)</td></tr> </table> いずれの場合も、食後に投与すること。 7. 用法及び用量に関連する注意 〈ウィルソン病（肝レンズ核変性症）〉 7.2 食物と同時摂取した場合、本剤の効果が遅延するおそれがある。	対象	最大投与量(1日あたり)	成人及び体重30kg以上の小児	150mg(1回50mgを1日3回)	体重10kg以上30kg未満の小児	75mg(1回25mgを1日3回)	体重10kg未満の小児	25mg(1回12.5mgを1日2回、又は1回25mgを1日1回)
対象	最大投与量(1日あたり)								
成人及び体重30kg以上の小児	150mg(1回50mgを1日3回)								
体重10kg以上30kg未満の小児	75mg(1回25mgを1日3回)								
体重10kg未満の小児	25mg(1回12.5mgを1日2回、又は1回25mgを1日1回)								

- 記載している内容は、製品を適正に使用していただくための参考であり、医薬品の使用は、個々の患者さんの状況に応じて、専門的知識を有する医療従事者にご判断いただくことを想定しております。
- 当 Q&A に関することや、その他のご不明な点については、弊社の医薬品情報センター (TEL : 0120-381-999) または担当 MR までお問い合わせください。
- なお、製品のご使用にあたっては、最新の電子添文もご確認いただきますようお願いいたします。

[電子添文]

酢酸亜鉛錠 25mg/50mg「サワイ」: https://med.sawai.co.jp/file/pr1_4806.pdf

酢酸亜鉛顆粒 5%「サワイ」: https://med.sawai.co.jp/file/pr1_4823.pdf