25-21

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。—

sawai

使用上の注意改訂のお知らせ

2025年7月
沢井製薬株式会社

プロトンポンプ・インヒビター
日本薬局方　ランソプラゾール腸溶カプセル
ランソプラゾールカプセル15mg「サワイ」
ランソプラゾールカプセル30mg「サワイ」

プロトンポンプ・インヒビター
日本薬局方　ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」
ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」

この度、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

1．改訂内容（取り消し線部削除箇所）

改訂後

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
2.2 リルピビリン塩酸塩を投与中の患者[10.1参照]

10. 相互作用
本剤は主として肝薬物代謝酵素CYP2C19又はCYP3A4で代謝される。
また、本剤の胃酸分泌抑制作用により、併用薬剤の吸収を促進又は抑制することがある。

10.1 併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
〈該当項目削除〉		

改訂前

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
2.2 ~~アタザナビル硫酸塩、~~リルピビリン塩酸塩を投与中の患者[10.1参照]

10. 相互作用
本剤は主として肝薬物代謝酵素CYP2C19又はCYP3A4で代謝される。
また、本剤の胃酸分泌抑制作用により、併用薬剤の吸収を促進又は抑制することがある。

10.1 併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
~~アタザナビル硫酸塩 レイアタッツ [2.2参照]~~	~~アタザナビル硫酸塩の作用を減弱するおそれがある。~~	~~本剤の胃酸分泌抑制作用によりアタザナビル硫酸塩の溶解性が低下し、アタザナビルの血中濃度が低下する可能性がある。~~

2．改訂理由

自主改訂
相互作用相手薬の販売中止に基づき、改訂致しました。

改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(https://www.pmda.go.jp)および弊社の医療関係者向け総合情報サイト(https://med.sawai.co.jp)に掲載しております。

ランソプラゾールカプセル15mg/30mg「サワイ」　(01)14987080604010
ランソプラゾールOD錠15mg/30mg「サワイ」　(01)14987080610011

沢井製薬株式会社　大阪市淀川区宮原5丁目2-30
TEL：0120-381-999