

使用上の注意改訂のお知らせ

2023年9月
沢井製薬株式会社

EPA製剤

日本薬局方 イコサペント酸エチルカプセル

イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」

イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「サワイ」

イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」

イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」

この度、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

改訂後	改訂前						
<p>【禁忌】(次の患者には投与しないこと)</p> <p>2)ミフェプリストン・ミソプロストールを投与中の患者(「相互作用」の項参照)</p>	<p>【禁忌】(次の患者には投与しないこと)</p> <p>〈該当項目なし〉</p>						
<p>【使用上の注意】</p> <p>3. 相互作用</p> <p>1)併用禁忌(併用しないこと)</p> <table><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td>ミフェプリストン・ミソプロストール (メフィーゴパック)</td><td>ミフェプリストン・ミソプロストールによる子宮出血の程度が悪化するおそれがある。</td><td>イコサペント酸エチルの抗血小板作用により出血が増強するおそれがある。</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	ミフェプリストン・ミソプロストール (メフィーゴパック)	ミフェプリストン・ミソプロストールによる子宮出血の程度が悪化するおそれがある。	イコサペント酸エチルの抗血小板作用により出血が増強するおそれがある。	<p>【使用上の注意】</p> <p>3. 相互作用</p> <p>「併用禁忌」の項新設</p>
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子					
ミフェプリストン・ミソプロストール (メフィーゴパック)	ミフェプリストン・ミソプロストールによる子宮出血の程度が悪化するおそれがある。	イコサペント酸エチルの抗血小板作用により出血が増強するおそれがある。					

2. 改訂理由

自主改訂

相互作用相手薬との記載の整合を図るため、改訂致しました。



改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け総合情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。

イコサペント酸エチルカプセル 300mg「サワイ」 イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg/600mg/900mg「サワイ」



(01)14987080647017



(01)14987080735417



沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30
TEL: 0120-381-999