

セフェム系抗生物質製剤

2018年 8 月

処方箋医薬品

セフトリアキソンNa 静注用0.5g「サワイ」

セフトリアキソンNa 静注用1g「サワイ」

(注射用セフトリアキソンナトリウム)

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原 5 丁目 2-30
TEL: 0120(381)999

使用上の注意改訂のお知らせ

この度、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知(平成30年 8 月 2 日付)等に基づき、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

・改訂内容 (____ 部：通知に基づく改訂箇所、取り消し線部：自主改訂箇所)

改 訂 後	改 訂 前
<p>4. 副作用</p> <p>1) 重大な副作用 (頻度不明)</p> <p>(10) 精神神経症状：意識障害(意識消失、意識レベルの低下等)、痙攣、不随意運動(舞蹈病アテトーゼ、ミオクローヌス等)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。これらの症状は、高度腎障害患者での発現が多数報告されている。</p> <p>8. 臨床検査結果に及ぼす影響</p> <p>1) テステープ反応を除くベネディクト試薬、フェーリング試薬による尿糖検査では偽陽性を呈することがあるので注意すること。</p>	<p>4. 副作用</p> <p>1) 重大な副作用 (頻度不明)</p> <p>(10) 意識障害：意識消失、意識レベルの低下等の意識障害があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。これらの意識障害は、高度腎障害患者での発現が多数報告されている。</p> <p>8. 臨床検査結果に及ぼす影響</p> <p>1) テステープ反応を除くベネディクト試薬、フェーリング試薬、クラニテストによる尿糖検査では偽陽性を呈することがあるので注意すること。</p>

☆ 改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<http://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け情報サイト(<http://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。