

使用上の注意改訂のお知らせ

2025年11月
沢井製薬株式会社

高血圧・狭心症・不整脈治療剤

劇薬、処方箋医薬品

日本薬局方 メトプロロール酒石酸塩錠

メトプロロール酒石酸塩錠 20mg「サワイ」**メトプロロール酒石酸塩錠 40mg「サワイ」**

この度、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

1. 改訂内容（取り消し線部削除箇所）

改 訂 後			改 訂 前		
10. 相互作用			10. 相互作用		
10.2 併用注意(併用に注意すること)			10.2 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
交感神経系に対し抑制的に作用する他の薬剤 β遮断剤(チモロール等の点眼剤を含む)等	過剰の交感神経抑制を来し、徐脈、血圧低下等があらわれるおそれがあるので、用量に注意すること。	共に交感神経抑制作用を有するため。	交感神経系に対し抑制的に作用する他の薬剤 レセルピン β遮断剤(チモロール等の点眼剤を含む)等	過剰の交感神経抑制を来し、徐脈、血圧低下等があらわれるおそれがあるので、用量に注意すること。	共に交感神経抑制作用を有するため。
Class I 抗不整脈剤 ジソピラミド プロカインアミド等 Class III 抗不整脈剤 アミオダロン等	過度の心機能抑制があらわれることがあるので、用量に注意すること。	共に心機能抑制作用を有するため。	Class I 抗不整脈剤 ジソピラミド プロカインアミド アジマリン等 Class III 抗不整脈剤 アミオダロン等	過度の心機能抑制があらわれることがあるので、用量に注意すること。	共に心機能抑制作用を有するため。

2. 改訂理由

自主改訂

相互作用相手薬の販売中止に基づき、改訂致しました。

改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け総合情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載しております。

メトプロロール酒石酸塩錠 20mg/40mg「サワイ」



(01)14987080033711

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目 2-30
TEL: 0120-381-999