

持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤

2021年11月

処方箋医薬品

日本薬局方 リシノプリル錠

リシノプリル錠5mg「サワイ」

リシノプリル錠10mg「サワイ」

リシノプリル錠20mg「サワイ」

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30  
TEL: 0120(381)999

使用上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり使用上の注意を自主改訂致しますので、お知らせ申し上げます。  
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

・改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

改訂後	改訂前
<p><b>【禁忌】(次の患者には投与しないこと)</b></p> <p>2) <u>サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物を投与中の患者又は投与中止から36時間以内の患者</u>（「相互作用」の項参照）</p> <p>7) アリスキレンフマル酸塩を投与中の糖尿病患者（ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く）〔非致死性脳卒中、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧のリスク増加が報告されている。（「重要な基本的注意」及び「相互作用」の項参照）〕</p>	<p><b>【禁忌】(次の患者には投与しないこと)</b></p> <p>〈該当項目なし〉</p> <p>6) アリスキレンを投与中の糖尿病患者（ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く）〔非致死性脳卒中、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧のリスク増加が報告されている。（「重要な基本的注意」の項参照）〕</p>

（裏面につづく）



改訂後			改訂前		
【使用上の注意】			【使用上の注意】		
3. 相互作用			3. 相互作用		
1) 併用禁忌(併用しないこと)			1) 併用禁忌(併用しないこと)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
サクビトリル バルサルタン ナトリウム水 和物 (エンレスト)	血管浮腫があらわれ るおそれがある。左記薬 剤が投与されている場合 は、少なくとも本剤投与 開始36時間前に中止す ること。また、本剤投与 終了後に左記薬剤を投与 する場合は、本剤の最終 投与から36時間後まで は投与しないこと。	併用により相加的に ブラジキニンの分解を 抑制し、血管浮腫の リスクを増加させる 可能性がある。			
アリスキレン フマル酸塩 (ラジレス)	非致死性脳卒中、腎 機能障害、高カリウム 血症及び低血圧を 発現するリスクが 増加することがある。	併用によりレニン・ アンジオテンシン系 阻害作用が増強され る可能性がある。 危険因子：アリス キレンフマル酸塩を 投与中の糖尿病患者 (ただし、他の降 圧治療を行っても なお血圧のコント ロールが著しく不 良の患者を除く)			〈該当項目なし〉

☆ 改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。