

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2025年3月  
沢井製薬株式会社プロトンポンプ・インヒビター  
ラベプラゾールナトリウム錠

ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ」

ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」

プロトンポンプ・インヒビター  
ラベプラゾールナトリウム錠

ラベプラゾールNa錠20mg「サワイ」

この度、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

## 1. 改訂内容（取り消し線部削除箇所）

改訂後	改訂前												
<p>2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)</p> <p>2.2 リルピピリン塩酸塩を投与中の患者[10.1参照]</p>	<p>2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)</p> <p>2.2 アタザナビル硫酸塩—リルピピリン塩酸塩を投与中の患者[10.1参照]</p>												
<p>10. 相互作用</p> <p>本剤の代謝には肝代謝酵素チトクロームP450 2C19 (CYP2C19)及び3A4(CYP3A4)の関与が認められている。[16.4参照]</p> <p>また、本剤の胃酸分泌抑制作用により、併用薬剤の吸収を促進又は抑制することがある。</p>	<p>10. 相互作用</p> <p>本剤の代謝には肝代謝酵素チトクロームP450 2C19 (CYP2C19)及び3A4(CYP3A4)の関与が認められている。[16.4参照]</p> <p>また、本剤の胃酸分泌抑制作用により、併用薬剤の吸収を促進又は抑制することがある。</p>												
<p>10.1 併用禁忌(併用しないこと)</p> <table><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">〈該当項目削除〉</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	〈該当項目削除〉			<p>10.1 併用禁忌(併用しないこと)</p> <table><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td>アタザナビル硫酸塩(レイアタッツ) [2.2参照]</td><td>アタザナビルの作用が減弱するおそれがある。</td><td>本剤の胃酸分泌抑制作用により、胃内pHが上昇し、アタザナビルの溶解性が低下し、アタザナビルの血中濃度が低下するおそれがある。</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	アタザナビル硫酸塩(レイアタッツ) [2.2参照]	アタザナビルの作用が減弱するおそれがある。	本剤の胃酸分泌抑制作用により、胃内pHが上昇し、アタザナビルの溶解性が低下し、アタザナビルの血中濃度が低下するおそれがある。
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子											
〈該当項目削除〉													
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子											
アタザナビル硫酸塩(レイアタッツ) [2.2参照]	アタザナビルの作用が減弱するおそれがある。	本剤の胃酸分泌抑制作用により、胃内pHが上昇し、アタザナビルの溶解性が低下し、アタザナビルの血中濃度が低下するおそれがある。											

## 2. 改訂理由

自主改訂

相互作用相手薬の販売中止に基づき、改訂致しました。

改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け総合情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載しております。

ラベプラゾールNa錠5mg/10mg「サワイ」



(01)14987080230110

ラベプラゾールNa錠20mg「サワイ」



(01)14987080671012



沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30  
TEL: 0120-381-999