

使用上の注意改訂のお知らせ

2026年4月

沢井製薬株式会社

深在性真菌症治療剤

処方箋医薬品

日本薬局方 フルコナゾールカプセル

フルコナゾールカプセル 50mg「サワイ」

フルコナゾールカプセル 100mg「サワイ」

深在性真菌症治療剤

処方箋医薬品

日本薬局方 フルコナゾール注射液

フルコナゾール静注液 50mg「サワイ」

フルコナゾール静注液 100mg「サワイ」

フルコナゾール静注液 200mg「サワイ」

この度、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

1. 改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

改訂後			改訂前		
10. 相互作用 本剤は、CYP2C9、2C19及び3A4を阻害する。			10. 相互作用 本剤は、CYP2C9、2C19及び3A4を阻害する。		
10.2 併用注意(併用に注意すること)			10.2 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
リメゲパント	リメゲパントのAUC上昇の報告があり、リメゲパントの副作用が増強されるおそれがある。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。			
エトラシモド	エトラシモドのAUCが84%増加したとの報告がある。	本剤はエトラシモドの主たる代謝酵素であるCYP3A4及び2C9を阻害するので、併用によりエトラシモドの血中濃度が上昇することがある。			
					〈該当項目なし〉

2. 改訂理由

自主改訂

相互作用相手薬との記載の整合性をとるため、改訂致しました。



改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け総合情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載しております。

フルコナゾールカプセル50mg/100mg「サワイ」 フルコナゾール静注液50mg/100mg/200mg「サワイ」



(01)14987080603112



(01)14987080716010