

HMG-CoA還元酵素阻害剤

2018年10月

処方箋医薬品

日本薬局方 アトルバスタチンカルシウム錠

アトルバスタチン錠5mg「サワイ」

アトルバスタチン錠10mg「サワイ」

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30
TEL: 0120(381)999

持続性Ca拮抗薬/HMG-CoA還元酵素阻害剤

劇薬・処方箋医薬品

アマリエット®配合錠1番「サワイ」

アマリエット®配合錠2番「サワイ」

アマリエット®配合錠3番「サワイ」

アマリエット®配合錠4番「サワイ」

(アマロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム配合錠)

使用上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり使用上の注意を自主改訂致しますので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

・改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

改訂後			改訂前		
3.相互作用 アトルバスタチンは、主として肝の薬物代謝酵素CYP3A4により代謝される。またアマロジピンの代謝には主として薬物代謝酵素CYP3A4が関与していると考えられている。			3.相互作用 アトルバスタチンは、主として肝の薬物代謝酵素CYP3A4により代謝される。またアマロジピンの代謝には主として薬物代謝酵素CYP3A4が関与していると考えられている。		
2)併用注意(併用に注意すること) アトルバスタチン			3)併用注意(併用に注意すること) アトルバスタチン		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
レテルモビル	レテルモビルとの併用によりアトルバスタチンの血漿中薬物濃度が上昇した(C _{max} :2.17倍、AUC _{0-∞} :3.29倍)との報告がある。	機序：レテルモビルによるCYP3A4の阻害、アトルバスタチンの肝への取り込み阻害及び乳癌耐性蛋白(BCRP)の阻害が考えられている。	〈該当項目なし〉		

<アマリエット配合錠1番/2番/3番/4番「サワイ」での例>



☆ 改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<http://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け情報サイト(<http://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。