

自律神経調整剤

2017年10月

処方箋医薬品

トフィソパム錠50mg「サワイ」

(トフィソパム錠)

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30  
TEL: 06(6105)5816

使用上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり使用上の注意を自主改訂致しますので、お知らせ申し上げます。  
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

・改訂内容 (下線部改訂又は追加箇所)

改訂後	改訂前						
<p><b>【禁忌】(次の患者には投与しないこと)</b> ロミタピドメシル酸塩を投与中の患者(「相互作用」の項参照)</p>	「禁忌」の項新設						
<p><b>【使用上の注意】</b></p> <p>3. 相互作用</p> <p>1) 併用禁忌(併用しないこと)</p>	<p><b>【使用上の注意】</b></p> <p>3. 相互作用</p> <p>「併用禁忌」の項新設</p>						
<table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td>ロミタピドメシル酸塩 (ジャクス タピッド)</td><td>ロミタピドメシル酸塩の血中濃度が著しく上昇するおそれがある。</td><td>本剤がCYP3Aを阻害することにより、ロミタピドメシル酸塩の代謝が阻害される。</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	ロミタピドメシル酸塩 (ジャクス タピッド)	ロミタピドメシル酸塩の血中濃度が著しく上昇するおそれがある。	本剤がCYP3Aを阻害することにより、ロミタピドメシル酸塩の代謝が阻害される。	
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子					
ロミタピドメシル酸塩 (ジャクス タピッド)	ロミタピドメシル酸塩の血中濃度が著しく上昇するおそれがある。	本剤がCYP3Aを阻害することにより、ロミタピドメシル酸塩の代謝が阻害される。					



☆ 改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<http://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け情報サイト(<http://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。