

15員環マクロライド系抗生物質製剤

2015年 9 月

処方箋医薬品

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原 5 丁目 2-30
TEL: 06(6105)5816

アジスロマイシン錠 250mg「サワイ」

(アジスロマイシン錠)

使用上の注意改訂のお知らせ

この度、厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知(平成27年 9 月15日付)に基づき、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

・改訂内容 (____ 部: 薬食安に基づく改訂箇所)

| 改 訂 後 | 改 訂 前 |
|---|---|
| <p>4. 副作用</p> <p>1) 重大な副作用 (頻度不明)</p> <p>(3) <u>薬剤性過敏症症候群</u>: 初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。なお、ヒトヘルペスウイルス 6 (HHV-6) 等のウイルスの再活性化を伴うことが多く、投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること。</p> | <p>4. 副作用</p> <p>1) 重大な副作用 (頻度不明)</p> <p>〈該当項目なし〉</p> |



☆ 改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ (<http://www.pmda.go.jp>) および弊社の医療関係者向け情報サイト (<http://med.sawai.co.jp>) に掲載致しますので、併せてご参照下さい。