

タキソイド系抗悪性腫瘍剤

毒薬・処方箋医薬品

日本薬局方 ドセタキセル注射液

ドセタキセル 点滴静注液 20mg/1mL「サワイ」

ドセタキセル 点滴静注液 80mg/4mL「サワイ」

日本薬局方 注射用ドセタキセル

ドセタキセル 点滴静注用 20mg「サワイ」

ドセタキセル 点滴静注用 80mg「サワイ」

2018年 3月

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30
TEL: 06(6105)5816

使用上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり使用上の注意を自主改訂致しますので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

・改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

改訂後	改訂前
<p>4. 副作用</p> <p>1) 重大な副作用(頻度不明)</p> <p>(4)<u>急性腎障害</u>：急性腎障害等の重篤な腎障害があらわれることがあるので、腎機能検査の値に注意して観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。</p> <p>9. 適用上の注意</p> <p>2) 投与時：</p> <p>(2)静脈内投与に際し、薬液が血管外に漏れると、注射部位に硬結・壊死をおこすことがあるので薬液が血管外に漏れないように投与すること。 また、以前に同反応を発現した注射部位とは異なる部位に本剤を再投与した場合、<u>以前の注射部位に同反応を再発する</u>といった、いわゆる「Recall現象」が認められたとの報告がある。</p>	<p>4. 副作用</p> <p>1) 重大な副作用(頻度不明)</p> <p>(4)急性腎不全：急性腎不全等の重篤な腎障害があらわれることがあるので、腎機能検査の値に注意して観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。</p> <p>9. 適用上の注意</p> <p>2) 投与時：</p> <p>(2)静脈内投与に際し、薬液が血管外に漏れると、注射部位に硬結・壊死をおこすことがあるので薬液が血管外に漏れないように投与すること。</p>