

β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

2018年 6 月

処方箋医薬品

日本薬局方 注射用アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原 5 丁目 2-30
TEL: 06(6105)5816

ユーシオン[®]-S 静注用 0.75g
ユーシオン[®]-S 静注用 1.5g
ユーシオン[®]-S 静注用 3g

使用上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり使用上の注意を自主改訂致しますので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

・改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

改 訂 後	改 訂 前
<p>4. 副作用</p> <p>1) 重大な副作用（頻度不明）</p> <p>(4) <u>急性腎障害、間質性腎炎</u>：急性腎障害、間質性腎炎等の重篤な腎障害があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。</p> <p>(5) <u>出血性大腸炎、偽膜性大腸炎</u>：出血性大腸炎、偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎があらわれることがあるので、腹痛、頻回の下痢があらわれた場合には直ちに投与を中止するなど適切な処置を行うこと。</p>	<p>4. 副作用</p> <p>1) 重大な副作用（頻度不明）</p> <p>(4) <u>急性腎不全、間質性腎炎</u>：急性腎不全、間質性腎炎等の重篤な腎障害があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。</p> <p>(5) <u>偽膜性大腸炎</u>：偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎があらわれることがあるので、腹痛、頻回の下痢があらわれた場合には直ちに投与を中止するなど適切な処置を行うこと。</p>