

潰瘍性大腸炎治療剤

2017年 8 月

処方箋医薬品

メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」

(メサラジン錠)

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原 5 丁目 2-30
TEL: 06(6105)5816

用法・用量 追加のお知らせ

この度、弊社の「メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」」(有効成分：メサラジン)につきまして、平成29年 8 月 2 日付で用法・用量が追加になりました。それに伴い、下記のとおり、用法・用量を変更致しますので、お知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

・新旧対照表 (下線部改訂又は追加箇所)

	新	旧
効能・効果	潰瘍性大腸炎(重症を除く)	同 左
用法・用量	通常、成人にはメサラジンとして1日2,400mgを3回に分けて食後経口投与するが、 <u>寛解期には、必要に応じて1日1回2,400mg食後経口投与とすることができる。</u> 活動期には、1日3,600mgを3回に分けて食後経口投与する。 なお、患者の状態により適宜減量する。	通常、成人にはメサラジンとして1日2,400mgを3回に分けて食後経口投与するが、活動期には、1日3,600mgを3回に分けて食後経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

