

## 選択的AT<sub>1</sub>受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤

2016年 1 月

劇薬・処方箋医薬品

# アムバロ<sup>®</sup>配合錠「サワイ」

(バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合錠)

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原 5 丁目 2 -30  
TEL : 06 ( 6 1 0 5 ) 5 8 1 6

## 使用上の注意改訂のお知らせ

この度、厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知(平成28年 1 月12日付)に基づき、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

### 記

#### ・改訂内容 ( \_\_\_\_ 部：通知に基づく改訂箇所)

改 訂 後	改 訂 前
<p>4. 副作用</p> <p>1) 重大な副作用 (頻度不明)</p> <p>(2) <u>劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸</u>：劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>(10) <u>横紋筋融解症</u>：筋肉痛、脱力感、CK (CPK) 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、<u>横紋筋融解症による急性腎不全の発症に注意すること。</u></p>	<p>4. 副作用</p> <p>1) 重大な副作用 (頻度不明)</p> <p>(2) <u>肝炎、肝機能障害、黄疸</u>：肝炎、肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>(10) <u>横紋筋融解症</u>：筋肉痛、脱力感、CK (CPK) 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p>

