

選択的AT₁受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤

2019年12月

劇薬・処方箋医薬品

アムバロ[®]配合錠「サワイ」

(バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合錠)

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30
TEL: 0120(381)999

使用上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり使用上の注意を自主改訂致しますので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

・改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

改 訂 後			改 訂 前		
3.相互作用 アムロジピンの代謝には主として薬物代謝酵素CYP3A4が関与していると考えられている。 併用注意(併用に注意すること)			3.相互作用 アムロジピンの代謝には主として薬物代謝酵素CYP3A4が関与していると考えられている。 併用注意(併用に注意すること)		
薬 剤 名 等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬 剤 名 等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
トリメトプリム含有製剤	血清カリウム値が上昇すること	血清カリウム値の上昇が増強される	〈該当項目なし〉		
スルファメトキサゾール・トリメトプリム	があるので、血清カリウム濃度に注意する。	る。			



☆ 改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<http://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。