

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2025年4月  
沢井製薬株式会社蛋白分解酵素阻害剤  
劇薬、処方箋医薬品  
ナファモスタットメシル酸塩注射剤  
**ナファモスタット**注射用10mg「SW」  
**ナファモスタット**注射用50mg「SW」

この度、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

## 1. 改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

改訂後			改訂前
10. 相互作用			「相互作用」の項新設
10.2 併用注意(併用に注意すること)			
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	
乾燥濃縮人活性化 プロテインC	活性化プロテイン Cの作用を減弱さ せるおそれがあ る。	本剤は活性化プロ テインCの活性を 低下させる。	
乾燥濃縮人プロテ インC			
トロンボモデュリ ン アルファ(遺伝 子組換え)	本剤の作用が増強 するおそれがあ る。本剤との併用 の安全性は明らか になっておらず、 併用に際しては慎 重に投与の判断を 行うこと。	併用により、抗凝 固作用が相加的に 作用する。	

## 2. 改訂理由

## 自主改訂

相互作用相手薬との記載の整合を図るため、改訂致しました。

改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および  
弊社の医療関係者向け総合情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載しております。

ナファモスタット注射用10mg/50mg「SW」



(01)14987080023910

