

使用上の注意改訂のお知らせ

2026年7月

沢井製薬株式会社

マクロライド系抗生物質製剤

処方箋医薬品

日本薬局方 エリスロマイシン腸溶錠

エリスロマイシン錠 200mg「サワイ」

この度、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

1. 改訂内容（取り消し線部削除箇所）

改 訂 後			改 訂 前		
10. 相互作用 本剤はCYP3Aで代謝される。また、本剤はCYP3A、P-糖蛋白質を阻害する。			10. 相互作用 本剤はCYP3Aで代謝される。また、本剤はCYP3A、P-糖蛋白質を阻害する。		
10.2 併用注意(併用に注意すること)			10.2 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ブロナンセリン クロザピン ゾピクロン アルプラゾラム エプレレノン エレトリプタン臭化水素酸塩 エベロリムス	これらの薬剤の作用が増強するおそれがある。	本剤はCYP3Aと結合し、複合体を形成するため、これらの薬剤の代謝を抑制し、血中濃度が上昇することがある。	ブロナンセリン クロザピン ゾピクロン アルプラゾラム エプレレノン エレトリプタン臭化水素酸塩 エベロリムス サキナビルメシル酸塩	これらの薬剤の作用が増強するおそれがある。	本剤はCYP3Aと結合し、複合体を形成するため、これらの薬剤の代謝を抑制し、血中濃度が上昇することがある。
〈該当項目削除〉			ザフィルルカスト	ザフィルルカストの血中濃度が低下するとの報告がある。	機序は不明である。

2. 改訂理由

自主改訂

相互作用相手薬の販売中止に基づき、改訂致しました。



改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け総合情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載しております。

エリスロマイシン錠 200mg「サワイ」



(01)14987080595318

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目 2-30
TEL : 0120-381-999