

オキサゾリジノン系合成抗菌剤

処方箋医薬品

リネゾリド[®]注射液 600mg「サワイ」

(リネゾリド注射液)

2019年 6 月

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原 5 丁目 2-30
TEL: 0120(381)999

効能・効果 追加のお知らせ

この度、弊社の「リネゾリド注射液600mg「サワイ」」(有効成分：リネゾリド)につきまして、令和元年6月5日付で効能・効果が追加になりました。それに伴い、下記のとおり、効能・効果を変更致しますので、お知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

・新旧対照表 (下線部改訂又は追加箇所)

	新	旧
効能・効果	<p>1.<適応菌種> 本剤に感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) <適応症> 敗血症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肺炎</p> <p>2.<適応菌種> 本剤に感性のバンコマイシン耐性エンテロコッカス・フェシウム <適応症> 各種感染症</p>	<p><適応菌種> 本剤に感性のバンコマイシン耐性エンテロコッカス・フェシウム <適応症> 各種感染症</p>
用法・用量	<p>通常、成人及び12歳以上の小児にはリネゾリドとして1日1200mgを2回に分け、1回600mgを12時間ごとに、それぞれ30分～2時間かけて点滴静注する。</p> <p>通常、12歳未満の小児にはリネゾリドとして1回10mg/kgを8時間ごとに、それぞれ30分～2時間かけて点滴静注する。なお、1回投与量として600mgを超えないこと。</p>	同 左