

副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン配合剤

2019年 1 月

処方箋医薬品

エンペラシン<sup>®</sup> 配合錠

(ベタメタゾン、*d*-クロルフェニラミンマレイン酸塩配合錠)

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原 5 丁目 2-30  
TEL: 0120(381)999

使用上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり使用上の注意を自主改訂致しますので、お知らせ申し上げます。  
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

・改訂内容 (下線部改訂又は追加箇所)

改 訂 後			改 訂 前		
<b>3.相互作用</b> ベタメタゾンは、主としてCYP3A4で代謝される。 <b>併用注意(併用に注意すること)</b>			<b>3.相互作用</b>  <b>併用注意(併用に注意すること)</b>		
薬 剤 名 等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬 剤 名 等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
エリスロマイシン	ベタメタゾンの作用が増強されるとの報告があるの で、併用する場合には本剤の用量に注意すること。	エリスロマイシンのCYP3A4に対する阻害作用により、ベタメタゾンの代謝が抑制される。	〈該当項目なし〉		



☆ 改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<http://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。