

高親和性AT₁レセプターブロッカー

2020年 1 月

処方箋医薬品

オルメサルタンOD錠5mg「サワイ」
オルメサルタンOD錠10mg「サワイ」
オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」
オルメサルタンOD錠40mg「サワイ」

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30
TEL：0120(381)999

(オルメサルタン メドキシミル口腔内崩壊錠)

使用上の注意改訂のお知らせ

この度、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知(令和2年1月21日付)に基づき、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

・改訂内容 (____ 部：通知に基づく改訂箇所)

改訂後	改訂前
<p>4. 副作用</p> <p>1) 重大な副作用 (頻度不明)</p> <p>(11) <u>間質性肺炎</u>：発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常等を伴う間質性肺炎があらわれることがあるので、このような場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。</p>	<p>4. 副作用</p> <p>1) 重大な副作用 (頻度不明)</p> <p>〈該当項目なし〉</p>



☆ 改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<http://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。