

HMG-CoA還元酵素阻害剤

処方箋医薬品

ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」

ロスバスタチン錠5mg「サワイ」

ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」

ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」

(ロスバスタチンカルシウム製剤)

2021年2月

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30

TEL: 0120(381)999

使用上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり使用上の注意を自主改訂致しますので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

●改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

| 改訂後 | | | 改訂前 | | |
|---|--|---|---|-----------|----------|
| 3. 相互作用 本剤は、OATP1B1及びBCRPの基質である。 2)併用注意(併用に注意すること) | | | 3. 相互作用 本剤は、OATP1B1及びBCRPの基質である。 2)併用注意(併用に注意すること) | | |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 | 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| カプマチニブ 塩酸塩水和物 | 本剤とカプマチニブ塩酸塩水和物を併用したとき、本剤のAUCが約2.1倍、Cmaxが約3.0倍上昇したとの報告がある。 | カプマチニブ塩酸塩がBCRPの機能を阻害することにより、本剤の血中濃度が増加する可能性がある。 | | | |
| バダデユスタット | 本剤とバダデユスタットを併用したとき、本剤のAUCが約2.5倍、Cmaxが約2.7倍上昇したとの報告がある。 | バダデユスタットがBCRPの機能を阻害することにより、本剤の血中濃度が増加する可能性がある。 | | | |
| | | | | | 〈該当項目なし〉 |

