

抗てんかん剤

劇薬・処方箋医薬品

ラモトリギン錠 小児用 2mg「サワイ」

ラモトリギン錠 小児用 5mg「サワイ」

抗てんかん剤、双極性障害治療薬

劇薬・処方箋医薬品

ラモトリギン錠 25mg「サワイ」

ラモトリギン錠 100mg「サワイ」

(ラモトリギン錠)

2019年11月

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原 5 丁目 2 - 30
TEL : 0120(381)999

使用上の注意改訂のお知らせ

この度、下記のとおり使用上の注意を自主改訂致しますので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

記

・改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

改訂後	改訂前								
<p>4. 副作用</p> <p>2) その他の副作用</p> <p>以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>血液</td><td>白血球減少、好中球減少、貧血、血小板減少、リンパ節症、<u>低ガンマグロブリン血症</u></td></tr></tbody></table>		頻度不明	血液	白血球減少、好中球減少、貧血、血小板減少、リンパ節症、 <u>低ガンマグロブリン血症</u>	<p>4. 副作用</p> <p>2) その他の副作用</p> <p>以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>血液</td><td>白血球減少、好中球減少、貧血、血小板減少、リンパ節症</td></tr></tbody></table>		頻度不明	血液	白血球減少、好中球減少、貧血、血小板減少、リンパ節症
	頻度不明								
血液	白血球減少、好中球減少、貧血、血小板減少、リンパ節症、 <u>低ガンマグロブリン血症</u>								
	頻度不明								
血液	白血球減少、好中球減少、貧血、血小板減少、リンパ節症								
<p>6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与</p> <p>3) 授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。〔本剤はヒト乳汁中へ移行し、授乳中の乳児における血中濃度は、授乳中の婦人の血中濃度の最大約50%に達したとの報告がある。<u>また、授乳されている新生児、乳児において、無呼吸、傾眠、体重増加不良等を起こすことが報告されている。</u>〕</p>	<p>6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与</p> <p>3) 授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。〔本剤はヒト乳汁中へ移行し、授乳中の乳児における血中濃度は、授乳中の婦人の血中濃度の最大約50%に達したとの報告がある。〕</p>								



☆ 改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ (<http://www.pmda.go.jp>) および弊社の医療関係者向け情報サイト (<https://med.sawai.co.jp>) に掲載致しますので、併せてご参照下さい。