

## 抗てんかん剤

劇薬・処方箋医薬品

**ラモトリギン錠 小児用2mg「サワイ」**

**ラモトリギン錠 小児用5mg「サワイ」**

2018年10月

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30  
TEL: 0120(381)999

## 抗てんかん剤、双極性障害治療薬

劇薬・処方箋医薬品

**ラモトリギン錠 25mg「サワイ」**

**ラモトリギン錠 100mg「サワイ」**

(ラモトリギン錠)

# 使用上の注意改訂のお知らせ

この度、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知(平成30年10月23日付)等に基づき、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

## 記

### ・改訂内容 ( —— 部：通知に基づく改訂箇所、 ..... 部：自主改訂箇所)

| 改訂後  | 改訂前   |
|--|---|
| <p>1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)</p> <p>6) <u>Brugada症候群の患者</u>(Brugada症候群に特徴的な心電図変化(右脚ブロック及び右側胸部誘導(V1~V3)のcoved型ST上昇)が顕在化したとの報告がある。)</p> <p>4. 副作用</p> <p>1) <b>重大な副作用</b>(頻度不明)</p> <p>(4) <u>血球貪食症候群</u>があらわれることがあるので、<u>観察を十分に行い、発熱、発疹、神経症状、脾腫、リンパ節腫脹、血球減少、高フェリチン血症、高トリグリセリド血症、肝機能障害、血液凝固障害等の異常が認められた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。</u></p> | <p>1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)</p> <p>〈該当項目なし〉</p> <p>4. 副作用</p> <p>1) <b>重大な副作用</b>(頻度不明)</p> <p>〈該当項目なし〉</p> |

