

使用上の注意改訂のお知らせ

2024年8月
沢井製薬株式会社

慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤
劇薬、処方箋医薬品
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合錠
トアラセット[®] 配合錠「サワイ」

この度、下記のとおり使用上の注意を改訂致しますので、お知らせ申し上げます。

1. 改訂内容（下線部改訂又は追加箇所）

改訂後			改訂前		
10. 相互作用 トラマドールは、主にCYP2D6及びCYP3A4によって代謝される。			10. 相互作用 トラマドールは、主にCYP2D6及びCYP3A4によって代謝される。		
10.2 併用注意(併用に注意すること)			10.2 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
メチルチオニウム塩化物水和物 (メチレンブルー)	セロトニン症候群 (錯乱、激越、発熱、発汗、運動失調、反射異常亢進、ミオクローヌス、下痢等)があらわれるおそれがある。	メチルチオニウム塩化物水和物のモノアミン酸化酵素阻害作用によりセロトニン作用が 増強される。	〈該当項目なし〉		

2. 改訂理由

自主改訂

同一成分薬のCCDS(企業中核データシート)が変更されたことに基づき、改訂致しました。



改訂後の電子添文につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社の医療関係者向け総合情報サイト(<https://med.sawai.co.jp>)に掲載しております。

トアラセット配合錠「サワイ」



(01)14987080362019

