

# 医療従事者の皆様へ <インフルエンザの患者さんへの注意喚起>

2022年11月

沢井製薬株式会社

大阪市淀川区宮原5丁目2-30

TEL: 0120(381)999

インフルエンザの患者さんでは、抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無や種類にかかわらず、異常行動に関連すると考えられる転落死等が報告されています。

特に、小児・未成年者につきましては、異常行動による転落等の万が一の事故を防止するため、予防的な対応として患者さん・ご家族・周囲の方々に対して以下の内容の注意喚起をお願い申し上げます。

## 〈異常行動による転落等の事故を予防するためのお願い〉

インフルエンザの患者さんでは、抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無や種類にかかわらず、異常行動に関連すると考えられる転落死等が報告されています。

### 異常行動

- ① 就学以降の小児・未成年者の男性で報告が多い(女性でも発現する)
- ② 発熱から2日間以内に発現することが多い

### (異常行動の例)

- ・突然立ち上がって部屋から出ようとする
- ・興奮して窓を開けてベランダに出て、飛び降りようとする
- ・人に襲われる感覚を覚え、外に走り出す
- ・突然笑い出し、階段を駆け上がろうとする
- ・自宅から出て外を歩いていて、話しかけても反応しない
- ・変なことを言い出し、泣きながら部屋の中を動き回る など

### 事故を防止するために

発熱から少なくとも2日間は、就寝中を含め、特に小児・未成年者が容易に住居外へ飛び出さないために、例えば、以下のような具体的な対策を講じるよう、保護者の方にご説明ください。

- ・玄関や全ての部屋の窓を確実に施錠する(内鍵、チェーンロック、補助鍵がある場合は、その活用を含む)
- ・ベランダに面していない部屋で寝かせる
- ・窓に格子のある部屋がある場合は、その部屋で寝かせる
- ・一戸建てにお住まいの場合は、できる限り1階で寝かせる

### (参照) タミフルと異常行動等の関連に係る報告書

(<https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000341848.pdf>)

なお、厚生労働省ホームページの「令和4年度 今冬のインフルエンザ総合対策について」の「令和4年度 インフルエンザQ&A」で異常行動についての注意喚起が掲載されており、併せてご参照くださいますようお願い申し上げます。

(参照)

○令和4年度 今冬のインフルエンザ総合対策について

(<https://www.mhlw.go.jp/stf/index2022.html>)

○令和4年度 インフルエンザQ&A

([https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryou/kenkou\\_kekkaku-kansenshou/infu influenza/QA2022.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou_kekkaku-kansenshou/infu influenza/QA2022.html))

- アマンタジン塩酸塩錠50mg/錠100mg/細粒10%「サワイ」、オセルタミビルカプセル75mg/DS3%「サワイ」を服用されるインフルエンザの患者さん・ご家族・周囲の方々に注意していただきたい事項をまとめた患者指導箋を用意しておりますので、ご活用ください。

アマンタジン塩酸塩「サワイ」を服用される患者さん・ご家族・周囲の方々へのお願い

インフルエンザにかかった時は、飛び降りなどの異常行動をおこすことがあります。(特に発熱から2日間は要注意!) 窓の鍵を確実にかけるなど、異常行動に備えた対策を徹底してください。

- <異常行動による転落等の事故を予防するためのお願い>
- インフルエンザの患者さんでは、抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無や種類にかかわらず、異常行動に関連すると考えられる転落死等が報告されています。
  - 異常行動は、
    - ①就学以降の小児・未成年者の男性で報告が多い(女性でも発現する)
    - ②発熱から2日間以内に発現することが多いことが知られています。
  - (異常行動の例)
    - ・突然立ち上がりて部屋から出ようとする
    - ・興奮して窓を開けてベランダに出て、飛び降りようとする
    - ・人に襲われる感覚を覚え、外に走り出す
    - ・突然笑い出し、階段を駆け上がるようとする
    - ・自宅から出でて歩いていて、話しかけても反応しない
    - ・変なことを言い出し、泣きながら部屋の中を動き回る など
  - 万が一の転落等の事故を防止するため、発熱から少なくとも2日間は、就寝中を含め、特に小児・未成年者が容易に住居外へ飛び出さないために、例えば、以下のような対策を講じてください。
    - ・玄関や全ての部屋の窓を確実に施錠する(内鍵、チェーンロック、補助鍵がある場合は、その活用を含む)
    - ・ベランダに面していない部屋で寝かせる
    - ・窓に格子のある部屋がある場合は、その部屋で寝かせる
    - ・一戸建てにお住まいの場合は、できる限り1階で寝かせる

\*アマンタジン塩酸塩「サワイ」はA型インフルエンザウイルス感染症のみに効果があります。

沢井製薬株式会社

GU000701PV02

2018年8月版 3

オセルタミビルカプセル75mg/DS3%「サワイ」を服用される患者さん・ご家族・周囲の方々へ

オセルタミビル「サワイ」はインフルエンザウイルスが増えるのを抑え、熱などの症状を早期に改善させるお薬です。

1日2回5日間 お飲みください。

- 医師・薬剤師の指示に従い、最後までお飲みください。  
●熱が下がり、症状が軽快してもインフルエンザウイルスは体内に残っています。  
周囲へ感染させることもあるので、服用中は安静に過ごすことが大切です。  
※学校保健安全法では、出席停止期間の基準を定めています。(詳しくは裏面をご参照ください)

主な副作用として、腹痛、下痢、嘔吐、発疹、尋麻疹等があらわれることがあります。また、出血がおこることがあるので、血便、吐血、不正子宮出血(月経とは違う時期の出血)などの症状があらわれた場合は、医師に連絡してください。

<異常行動による転落等の事故を予防するためのお願い>

インフルエンザにかかった時は、飛び降りなどの異常行動をおこすことがあります。(特に発熱から2日間は要注意!) 窓の鍵を確実にかけるなど、異常行動に備えた対策を徹底してください。

- インフルエンザの患者さんでは、抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無や種類にかかわらず、異常行動に関連すると考えられる転落死等が報告されています。
- 異常行動は、①就学以降の小児・未成年者の男性で報告が多い(女性でも発現する)
  - ②発熱から2日間以内に発現することが多いことが知られています。

(異常行動の例)  
突然立ち上がりて部屋から出ようとする / 興奮して窓を開けてベランダに出て、飛び降りようとする / 人に襲われる感覚を覚え、外に走り出す / 突然笑い出し、階段を駆け上がるようとする / 自宅から出でて歩いていて、話しかけても反応しない / 変なことを言い出し、泣きながら部屋の中を動き回る など

●万が一の転落等の事故を防止するため、発熱から少なくとも2日間は、就寝中を含め、特に小児・未成年者が容易に住居外へ飛び出さないために、例えば、以下のようないくつかの対策を講じてください。

- ・玄関や全ての部屋の窓を確実に施錠する(内鍵、チェーンロック、補助鍵がある場合は、その活用を含む)
- ・ベランダに面していない部屋で寝かせる
- ・窓に格子のある部屋がある場合は、その部屋で寝かせる
- ・一戸建てにお住まいの場合は、できる限り1階で寝かせる

- アマンタジン塩酸塩錠50mg/錠100mg/細粒10%「サワイ」、オセルタミビルカプセル75mg/DS3%「サワイ」の使用に際しては、最新の電子添文をご確認ください。

アマンタジン塩酸塩  
錠50mg/錠100mg/細粒10%「サワイ」



(01)14987080000744

オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」



(01)14987080267413

オセルタミビルDS3%「サワイ」



(01)1498708026841

※専用アプリ「添文ナビ」で読み取ることで、電子添文を閲覧できます。