

シクロスポリンカプセル「TC」 を服用される方へ

注意 以下の場合には必ず主治医に相談してください

- ・薬を服用して発疹などが出たことがある。
- ・他に薬を服用している。
- ・妊娠または授乳中である。
- ・最近予防接種を受けた、もしくは受ける予定がある。

服用方法

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で服用してください。
また、服用量等は、必ず主治医の指示に従ってください。

服用するのを忘れた場合

気がついた時にできるだけ早く1回分を服用してください。
ただし、次に飲む時間が近い場合は、1回とばして次の時間に1回分飲んでください。

絶対に2回分をまとめて1度に服用しないでください。

注意が必要な飲食物

グレープフルーツジュース*、セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品はこのお薬の効果に影響しますので、控えてください。

*一部のかんきつ類(グレープフルーツ、ブンタン等)でも効果に影響することがあるため、なるべく食べることは避けてください。

あやまって多く服用した場合

すぐに主治医または薬剤師に相談してください。

高齢者の方へ

特に指示を守って服用してください。

その他の注意

自分の判断で服用をやめたり、このお薬のかわりにサンディミュンを服用しないでください。

保管上の注意

高温になる場所や、湿度の高い場所、直射日光を避けて保存してください。また、小児の手の届かない場所に保管してください。

医療機関名／連絡先