

レボフロキサシン錠250mg「サワイ」

レボフロキサシン錠500mg「サワイ」

を服用される患者さんへ

・・・ ご使用になられる先生方へ ・・・

PK-PD 理論に基づいた適正使用の観点から、  
**「治療効果の向上」と「耐性菌の出現抑制」**のため  
に必ず1日1回で服用するようお願いください。

レボフロキサシンは、薬物血中濃度と効果が相関  
する濃度依存性の抗菌薬です。

1日1回投与は分割投与に比べ高い Cmax を得る  
ことができ、より強い殺菌力が期待できます。

沢井製薬株式会社

# レボフロキサシン錠250mg「サワイ」 レボフロキサシン錠500mg「サワイ」 を服用される患者さんへ

このお薬は、感染症の原因である細菌の増殖をおさえ、殺菌作用を示します。

本紙をよくお読みいただき、正しく服用しましょう。

## 服用する際のお願い

主治医または薬剤師の指示を守って服用してください。

レボフロキサシン錠250mg/錠500mg「サワイ」は**1日1回**服用することで、感染症の原因菌を速く消失させ、症状を早く改善させることが期待できます。

必ず**1日1回**で  
服用してください。



# 服用する際の注意

---

- ▶ 指示通りに服用しなかった場合、感染症が治らなかったり、次に感染症にかかったときに治りにくくなる可能性もあります。
- ▶ 飲み忘れに気づいたときは、できるだけ早く服用してください。ただし次の服用時間に近い場合（8時間未満）は、忘れた分は服用せず、次回から服用するようにしてください。
- ▶ **絶対に2回分をまとめて1度に服用しないでください。**
- ▶ 誤って多く服用してしまったときは、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。
- ▶ 自己判断で服用をやめたり、量や回数を変更したりしないでください。

---

お薬についての質問や、服用中に気になる症状があらわれたときは、主治医または薬剤師にご相談ください。

医療機関名／連絡先