

経口用トロンビン細粒「サワイ」を 服用される患者さんへ

ご使用になられる先生方へ

この薬を服用する前に緩衝剤などにより胃酸を中和する必要があります。例えば、本剤を服用する前に約50mLの緩衝剤を服用し、5分後にトロンビン10,000～20,000単位を約50mLの緩衝剤に溶かして服用します。

服用には牛乳やリン酸緩衝液などの適切な緩衝剤を用い、アジ化ナトリウムなどの防腐剤を含有している緩衝剤は使用しないでください。

沢井製薬株式会社

経口用トロンビン細粒「サワイ」を服用される患者さんへ

必ず溶かしてお飲みください。

この薬は正しく飲まないとう
十分な効果が得られません。
必ず溶かしてお飲みく
ださい。

[用意するもの]

- ① 薬1回分



- ② 医療機関からこの薬と
一緒に飲むように
わたされた溶液
約100mL (1回分)




- ③ 容器、および
かき混ぜるためのもの
(スプーンや箸など)



飲み方

- ① まず、溶液を約50mL
(コップ4分の1くらい)
飲みます。




----- 約5分後 -----

- ② コップに溶液約50mLと薬
1回分を入れ、スプーンな
どでかき混ぜてよく溶か
します。



- ③ 溶けたら飲みます。



沢井製薬株式会社