

定期的に検査をおこないます

このお薬を飲み始めた後、まれではありますが副作用があらわれることがあります。

早期に副作用を発見するために、このお薬を飲み始めてから2ヵ月間は月に1回、またその後も定期的に肝臓や血液のはたらきを検査する必要があります。

副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば大事に至ることはほとんどありません。


医師の指示に従って定期的に受診して下さい。

その他わからないことがありましたら、医師又は薬剤師にご相談ください。

へ
や
ま
折
り
▼

テルビナフィン錠125mg「サワイ」を お飲みになる患者さんへ

このお薬は真菌(カビの一種)でおこる皮膚及び爪の感染症で、塗り薬では治らない場合や治りにくい場合に使います。



医師や薬剤師に伝えましょう



以下の項目に当てはまる方は、このお薬をお飲みになる前に、医師や薬剤師にお伝え下さい。

- 以前に薬を飲んで発しんなどがでたことがある人
- 肝臓の悪い人
- 血液の病気のある人
- 妊娠中または授乳中の人
- 他にお薬を使われている人

このお薬を飲んで、特に次のような症状があらわれたりその他気になる症状がありましたら、すぐに医師又は薬剤師に相談してください。

皮膚や目の症状



発しんができたり
皮膚が赤くなったり
かゆくなったりする



皮膚や白目が黄色
くなる



あざができる

かぜのような症状



発熱や寒気
冷や汗をかく



のどが痛くなったり
リンパ腺ははれる



息苦しくなったり
息切れしたりする

胃腸の症状



食欲不振
全身がだるい



吐き気がする
胃がむかむかする

筋肉痛などの症状



力が入らない
手足がしびれる



筋肉が痛い



尿の色が濃くなる
(赤褐色になる)

服用時の注意点！

上記の症状以外にも、眠気、めまい、ふらつきなどの症状があらわれることがあるため、**自動車の運転などには十分に注意**してください。