

あなたの投与量は

1週間

カプセルです

今回の服用スタート日

/ ()

1日		2日		3日	4日	5日	6日	7日
朝	昼	夕	朝	昼	夕			
カプセル		カプセル	カプセル					

この間は
お薬を服用しません。

▲この飲み方を繰り返します。

次回の診察日

/ ()

12時間
あけます

12時間
あけます

を
か
ま
し
り
く

メトトレキサート カプセル2mg「サワイ」 をお飲みになる患者さんへ

このお薬は関節リウマチの治療薬で、炎症を抑えることにより、関節の腫れや痛みの症状を改善します。

この説明書はこのお薬の大切な注意事項です。
よく読んで、正しくお飲みください。

大切なこと

- ・ 1週間のうち、シート表面に記入されている決められた日時に、決められた量だけお飲みください。
- ・ 決められた日時以外には、決して飲まないでください。
- ・ このお薬は、コップ1杯あるいはそれ以上の多めの水またはぬるま湯でお飲みください。

守ってほしいこと!!

- ・ 1週間に決められた量以上は飲まないでください。
- ・ 飲み忘れた分をまとめて飲まないでください。
- ・ 医師の指示なしに他のお薬（特に風邪薬や痛み止め）を飲まないでください。
- ・ 他の病気で別の医療機関を受診される場合には、医師または薬剤師にこのお薬を飲んでいることを必ずお伝えください。
- ・ このお薬を服用している間は、なるべくお酒を飲まないでください。
- ・ 妊娠している患者さん、授乳中の患者さんは服用しないでください。
- ・ このお薬を服用中の患者さんは妊娠しないように、また、男性患者さんはパートナーが妊娠しないように注意してください。

（たに折り）

下記のような症状が出た場合、服用を中止して、次の診療日を待たず すぐに医師に申し出てください。



せき（からせき）
かぜのような症状
のどの痛み



発熱



吐き気、胃痛、
食欲不振、下痢などの
胃腸症状



口内炎



息切れ、息苦しさ



尿の量・回数が急に
減った
体がむくんだ



（ひどく）疲れやすい



リンパ腺の腫れ



発疹、水疱など

これら以外に、いつもと違う症状などに気がつかれましたら、
医師にご相談ください。