

ニフェジピンCR錠「サワイ」を 服用される患者さんへお伝えください

医師 または 薬剤師のみなさまへ

本剤は素錠に3層のフィルム(溶出制御層、主薬層、遮光層)をコーティングした徐放剤であり、外層の遮光層及び主薬層は服薬後数分で溶けてきますが、溶出制御層内の素錠部は数時間以上かけて主成分が溶出してきます。そのため、服薬患者さんの体調や体質により排便が数時間以内であれば糞便中に錠剤の一部が排泄されることがありますので、予め患者さんへお伝え頂きますようお願いいたします。

また、服用時の注意について裏面に記載しておりますので、併せて患者さんへお伝え頂きますようお願いいたします。

沢井製薬株式会社

ニフェジピンCR錠「サワイ」を 服用される患者さんへ

この錠剤は1日1回～2回の服用で効果が発揮されるように設計された錠剤です。

服用すると錠剤の外側がすぐ溶けて効果を発揮したのち、内側がゆっくりと溶けだして効果を持続させます。

体調(下痢等)により服用後短時間に排便された場合、まれに錠剤の形のまま糞便中に排出されることがあります。

もし、服用期間中に下痢等の体調の異変を感じられましたら主治医又は薬剤師にその旨をお伝えください。

服用時の注意

- このお薬は、グレープフルーツに含まれる成分によって、作用が強くなり、血圧が下がりすぎてしまうことがあります。そのため、このお薬と同時にグレープフルーツを食べたり、グレープフルーツジュースを飲んだりすることは避け、コップ一杯の水またはぬるま湯で服用してください。
- このお薬は、割ったり、かみくだいたりして服用すると、頭痛、顔面潮紅等が発現しやすくなる可能性があります。そのため、割ったり、砕いたりしないで、そのままかまずに服用してください。

病院・医院・薬局名

沢井製薬株式会社