

## 副作用について

このお薬を飲んでいるときに、次のような副作用が起こる場合があります。

- 悪心・嘔吐 ○胸やけ
- 鼻出血 ○胃・腹部不快感
- 下痢 ○発疹など



このような症状や他にも気になる症状が現れたら医師に相談するようにしてください。

# イコサペント酸エチル<sup>カプセル</sup><sub>「サワイ」</sub>を

## お飲みになる患者さんへ

1日 回 食直後服用

1回につきカプセルを 個服用

**かまずにお飲みください!**

●病・医院名

## このお薬の働き

このお薬には、①血液を固まりにくくする、②血管の弾力性を保つ、③血液中のコレステロールや中性脂肪を下げるという3つの主な働きがあります。

この働きにより、へいそくせいどうみやくこうかしょう閉塞性動脈硬化症やこうしけっしやう高脂血症に効果を発揮します。

### へいそくせいどうみやくこうかしょう閉塞性動脈硬化症とは…

動脈硬化が原因で、足の血流障害を起こし、足の痛みや冷感などの症状を起こします。

## 飲み方について

このお薬は、空腹時にお飲みになると効き目が悪くなりますので、**食後すぐに、かまないでお飲みください。**



## 保管方法について

- 室温で、できるだけ涼しい所に保管してください。
- 直射日光、高温多湿の場所は避けて保管してください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。

## 服用に関する注意について

- このお薬は血液を固まりにくくするため、**抜歯や手術の予定がある場合**には、かならず医師に相談してください。
- **出血している病気がある場合**には必ず医師に相談し、指示に従うようにしてください。
- 他の病院・医院にかかる場合は、このお薬を飲んでいることを医師または薬剤師にお伝えください。

