

# グリメピリド錠「サワイ」 を服用される患者さんへ

0.5mg (実物大)



1mg (実物大)



3mg (実物大)



**グリメピリド錠「サワイ」は、血糖を下げる  
糖尿病のお薬です。**

## 服用時の注意

- コップ1杯程度の水またはぬるま湯で服用してください。
- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 自己判断により服用を中止したり、服用する量を変更したりすると病気が悪化することがあります。
- 指示された時間に服用を忘れてしまったら、1回とばして次の指示された時間から服用してください。

沢井製薬株式会社

裏面もご覧ください。

## 低血糖の対処法

- 脱力感、強い空腹感、冷や汗、動悸、手足のふるえ、意識が薄れる、などの症状があらわれることがあります。その場合はすぐに砂糖あるいはブドウ糖を摂取し、意識が薄れてきた場合はただちに医師に連絡してください。



- $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害薬（ボグリボース、アカルボース、ミグリトールなど）を併用している時に低血糖症状が認められた場合にはブドウ糖を摂取してください。



- この注意は必ず家族やまわりの方にも知らせておいてください。
- 高所作業や自動車の運転等危険を伴う機械を操作している時に、低血糖症状を起こすと事故につながります。特に注意してください。