

あなたが飲む  
おくすりは

# グリメピリド錠「サワイ」です

グリメピリド錠「サワイ」は、すい臓にはたらきかけて  
インスリンの分泌を促し、血糖\*を下げるおくすりです。

0.5mg (実物大)



1mg (実物大)



3mg (実物大)



\*ヘモグロビンA1c(HbA1c)、食後血糖、空腹時血糖

## おくすりの飲み方と量

あなたの症状などにあわせて、お医者さんが決めます。  
通常、1日0.5～1mgより開始し、1日1～2回朝または  
朝夕、食前または食後に服用します。維持量は通常  
1日1～4mgで、必要に応じて適宜増減し、1日最高  
投与量は6mgまで処方されます。

沢井製薬株式会社


裏面もご覧ください。

## おくすり(グリメピリド錠「サワイ」)を 飲む時に注意すること

- コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。
- 自分の判断でおくすりを中止したり、おくすりを変更したりすると病気が悪くなることがあります。
- 指示された時間に飲むのを忘れてしまったら、1 回とばして次の指示された時間から飲んでください。
- 決して 2 回分を一度に飲まないでください。(低血糖症を起こすことがあります。)
- お医者さんまたは薬剤師の先生の指示通りに飲んでください。
- 誤って多く飲んだときには、お医者さんまたは薬剤師の先生に相談してください。
- 発熱、下痢、嘔吐があり、または食欲がないため食事ができないときは、お医者さんに連絡して指示を受けましょう。

## 低血糖の対処法

- だるさ、強い空腹感<sup>くうふくかん</sup>、冷や汗、動悸<sup>どうき</sup>(胸がドキドキする)、手足のふるえ、意識<sup>いしき</sup>が薄れる<sup>うす</sup>、などの症状があらわれることがあります。その場合はすぐに砂糖あるいはブドウ糖を摂取し、意識が薄れてきた場合はただちに<sup>おうと</sup>お医者さんに連絡してください。
- α-グルコシダーゼ阻害剤(ベイスン、ボグリボース、グルコバイ、アカルボース、セイブルなど)と併用しているときに低血糖症状が認められた場合には**ブドウ糖**をとりましょう。



## 保護者の方へ

小さなお子様の場合には低血糖の症状が分からずに、自分で対処できないことがあるため、「低血糖かな?」と思う症状があらわれたときには砂糖やブドウ糖を摂取させ、よくならないときは主治医にみてもらうようにしてください。