

確認してください

- このお薬は血液を固まりにくくするため、**抜歯や手術の予定がある場合**には、必ず医師に相談してください。
- 出血している病気がある場合**には必ず医師に相談し、指示に従うようにしてください。
- このお薬を服用中は、ミフェプリストン・ミソプロストール(人工妊娠中絶のお薬)を使用することができません。ミフェプリストン・ミソプロストールの投与を受ける場合は、このお薬を飲んでいることを医師にお伝えください。
- 上記のほかにも、併用に注意が必要なお薬があります。他の病院・医院にかかる場合は、このお薬を飲んでいることを医師または薬剤師にお伝えください。


副作用について

このお薬を飲んでいるときに、次のような副作用が起こる場合があります。

- 悪心・嘔吐 ○胸やけ ○鼻出血
- 胃・腹部不快感 ○下痢 ○発疹など

このような症状や他にも気になる症状が現れたら医師に相談するようにしてください。

イコサペント酸エチル 粒状カプセル「サワイ」を お飲みになる患者さんへ



このお薬は、空腹時にお飲みになりますと効き目が悪くなりますので、食後すぐにかまないでお飲みください。

病院・医院名

このお薬の働き

このお薬には、①血液を固まりにくくする、②血管の弾力性を保つ、③血液中のコレステロールや中性脂肪を下げるといふ3つの主な働きがあります。


この働きにより、^{へいそくせいどうみやくこうか}閉塞性動脈硬化症や^{こうしじょう}高脂血症に効果を発揮します。

^{へいそくせいどうみやくこうか}閉塞性動脈硬化症とは…

動脈硬化が原因で、足の血流障害を起こし、足の痛みや冷感などの症状を起こします。

保管方法について

直射日光、高温多湿の場所をさけて、涼しい場所に保管してください。




服用にあたっての注意

①食後すぐにかまないでお飲みください。

②お薬が袋の端に残ってしまうことがあります。切り口と反対側の側面をふくらますように軽く広げてから、開封してください。



③開封するときは、切り口を上にして中のお薬がこぼれないよう静かに開けてください。



④お薬は直接袋から口に入れて下さい。



⑤飲み残しがないようにしてください。

⑥お湯などの温かい飲み物に混ぜないでください。

! 袋の切り口で、手や口などを切らないよう注意してください。