

クエチアピン「サワイ」を お飲みになる 患者さんとそのご家族の方へ

● 守ってほしいこと！

- お薬を飲む量は、患者さんの症状などにあわせて、医師が決めます。
体調がよくなったと自己判断して服用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがありますので、医師の指示どおり飲み続けることが重要です。
- 飲み忘れたからといって、決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1回分を飲んでください。
ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。

● 気をつけて欲しいこと！

- 眠気、注意力・集中力・反射能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。

クエチアピン「サワイ」をお飲みになるときは、次のことにご注意ください。

- このお薬を飲むことにより、高血糖、低血糖や体重増加がみられることがあります。血糖値の変化をみるため、服用されている間は定期的に血糖値の測定を行う場合があります。
- このお薬を服用していて、とくに以下のような症状があらわれたらこのお薬を飲むのをやめて、ただちに医師の診察を受けてください。

高血糖の症状

- 激しいのどの渇き(口渇)
- 水やジュースなどをたくさん飲む(多飲)



- 尿の量が多い(多尿)
- 尿の回数が多い(頻尿)

ご家族に糖尿病の方がいる患者さん、もともと血糖値が高い、あるいは肥満傾向のある患者さんなど、糖尿病になる危険性が高いと思われる方は、とくにご注意ください。

低血糖の症状

- 力のぬけた感じがする
- 倦怠感



●冷や汗



●手足のふるえ

- うとうとする



●意識が薄れる

その他にも気になる症状がありましたら、すぐに医師または薬剤師にご連絡ください。