

クロピドグレル錠「サワイ」を 服用される患者さんへ


このお薬は、抗血小板薬とよばれるお薬です。




抗血小板薬のはたらき

抗血小板薬は、血管の中で血栓（けっせん血のかたまり）ができるのを防いだり、血液を流れやすくして、脳梗塞などの再発を予防します。

▼ お薬を服用すると…



▼ ほうっておくと…



- ✓ 1日1回服用してください。
- ✓ 飲み忘れたときも、2回分をまとめて服用しないでください。
- ✓ 誤って他の人が飲まないように、厳重に保管してください。

服用中に、このような症状が出ていませんか？

いつもと違う下記のような症状に気づいたら、すぐに医師に連絡し、指示に従ってください。

皮膚や眼が黄色くなる



- ・鼻や歯ぐきから出血する
- ・コーヒー色のものを吐く



- ・強い疲労感を感じる
- ・食欲がない



- ・頭がズキズキ痛む
- ・かぜのような症状



気分が悪く、胃がムカムカする



- ・赤～黒っぽい便がでる
- ・尿が茶色っぽくなる



- ・うとうとする
- ・意識が低下する



- ・皮膚にあざができる
- ・赤みやぶつぶつが出る



血栓ができないようにするため、お薬を飲み続けることが大切です。ご自身の判断で服用をやめたり、お薬の量を減らしたりせず、医師の指示を守ってきちんと服用してください。