

⚠ 誤って飲むことのないよう、小児の手の届かないところに保管してください。

⚠ 未成年者での効果、安全性は確立していません。

効果が確認できるまで、服用を続けることが大切です(通常、6ヵ月間)。

ご自身の判断で、服用をやめたり、飲む量を変えたりしないようにしましょう。

医療機関名

沢井製薬株式会社

2023年8月©5

フィナステリド錠「サワイ」を服用される患者さんにご家族の方へ

このお薬は、男性における男性型脱毛症の進行を止めるものです。6ヵ月以上服用しても、抜け毛の進行が遅くならない場合は、医師に相談してください。

このお薬の使い方

1日1回、決められた量を服用してください。

成人男性の方のみ、このお薬を服用できます。

女性には効果が認められていません。
妊婦・授乳婦の方は、絶対に服用しないでください。
服用すると、男子胎児の生殖器官等の正常発育に、影響を及ぼすおそれがあります。

お薬を割って飲まないでください。

錠剤を割って服用した場合の安全性、有効性は保証されておりません。
妊娠中の方が破損した錠剤に触れて、有効成分が体内に吸収されると、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼすおそれがあります。

なお、お薬はコーティングしていますので、通常の取り扱いで有効成分に触れることはありません。

服用上のご注意

- ご自身の判断で、量や回数を変更したり、服用を中止したりしないでください。
- 飲み忘れた場合は、気がついたときにその日の分を飲んでください。2回分を一度に飲んではいけません。
- 誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- このお薬をご家族や他の人にあげないでください。
- このお薬の服用中および服用後1ヵ月間は献血をしないようにしてください。

このような方は 服用前に必ず医師・薬剤師にご相談を

- これまでに、他のお薬を服用して発疹などがでたことがある。
- 肝機能障害がある。
- うつ病などの精神疾患で治療を受けている、これまでに治療を受けたことがある。
- 前立腺がん検診(PSA検査)を受ける予定がある。
- 他の病気でお薬を服用している、新しく服用し始める予定である(薬局で買った市販薬も)。
- 男性型脱毛症に対して、市販の育毛ローションなど、他の対処法を行っている。

副作用について

- 以下のような副作用があらわれる可能性があります。気になる症状があらわれた場合は、すぐに医師・薬剤師にご相談ください。

性欲減退、勃起機能不全

- まれに、**食欲不振、全身倦怠感**などの肝機能障害の症状があらわれる可能性があります。すぐに服用をやめて、医師の診察を受けてください。
- このお薬との関連性は明らかではありませんが、生きるのがつらいと感じる、消えてしまいたいという気持ちになるといった症状があらわれたり、場合によっては死にたいという気持ちになったりすることが報告されています。
このような症状があらわれた場合は、服用をやめて、すぐに医師・薬剤師に連絡してください。