

フィナステリド錠「サワイ」を 服用される患者さんにご家族の方へ

このお薬は、男性における男性型脱毛症の進行を止めるものです。6ヵ月以上服用しても、抜け毛の進行が遅くならない場合は、医師に相談してください。

このお薬の使い方

1日1回、決められた量を服用してください。

成人男性の方のみ、このお薬を服用できます。

女性には効果が認められていません。

妊婦・授乳婦の方は、絶対に服用しないでください。
服用すると、男子胎児の生殖器官等の正常発育に、
影響を及ぼすおそれがあります。

お薬を割って飲まないでください。

錠剤を割って服用した場合の安全性、有効性は保証
されていません。

妊娠中の方が破損した錠剤に触れて、有効成分が体
内に吸収されると、男子胎児の生殖器官等の正常発
育に影響を及ぼすおそれがあります。

なお、お薬はコーティングしていますので、通常の取り扱いで
有効成分に触れることはありません。

医療機関名

沢井製薬株式会社

服用上のご注意

- ご自身の判断で、量や回数を変更したり、服用を中止したりしないでください。
- 飲み忘れた場合は、気がついたときにその日の分を飲んでください。2回分を一度に飲んではいけません。
- 誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- このお薬をご家族や他の人にあげないでください。
- このお薬の服用中および服用後1ヵ月間は献血をしないようにしてください。

このような方は 服用前に必ず医師・薬剤師にご相談を


- これまでに、他のお薬を服用して発疹などがでたことがある。
- 肝機能障害がある。
- 前立腺がん検診(PSA検査)を受ける予定がある。
- 他の病気でお薬を服用している、新しく服用し始める予定である(薬局で買った市販薬も)。
- 男性型脱毛症に対して、市販の育毛ローションなど、他の対処法を行っている。

副作用について

以下のような副作用があらわれる可能性があります。気になる症状があらわれた場合は、すぐに医師・薬剤師にご相談ください。

性欲減退、勃起機能不全

まれに、**食欲不振、全身倦怠感**などの肝機能障害の症状があらわれる可能性があります。すぐに服用をやめて、医師の診察を受けてください。

 誤って飲むことのないよう、小児の手の届かないところに保管してください。

 未成年者での効果、安全性は確立していません。

効果が確認できるまで、服用を続けることが大切です(通常、6ヵ月間)。

ご自身の判断で、服用をやめたり、飲む量を変えたりしないようにしましょう。