

カルシウム

ピタバスタチンCa・OD錠「サワイ」 を服用される患者さんへ

ピタバスタチンCa・OD錠「サワイ」は、コレステロールの合成を抑えることで、血液中のコレステロールを減らすお薬です。

このお薬の飲み方

- 1日1回、決められた量を服用します。
- 飲み忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。

このお薬は、口の中で速やかに溶けます

- 水なしで飲むことができます。唾液を含ませ舌で軽く押しつぶして、唾液と一緒に飲みこんでください。
- 普通のお薬と同じように水またはぬるま湯で飲むこともできます。
- どちらの飲み方でも、効きめは変わりません。

裏面もご覧ください。

このお薬を飲むときは、以下の点にご注意ください

おうもんきんゆうかいしょう

お薬の副作用として、ごくまれに「横紋筋融解症」という筋肉の障害が起きることが知られています。次のような症状がみられましたら、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。

筋肉が痛い



手足の力が
入らない

尿の色が濃い
(赤褐色になる)



「横紋筋融解症」以外にも、肝臓の副作用が現れることがあります。吐き気、嘔吐、全身のだるさ、皮膚や白目が黄色くなる、などの症状がみられましたら、すぐに主治医の診察を受けてください。

いつもと違う体調の変化に気づいた場合は、
主治医・薬剤師にご相談ください。

沢井製薬株式会社