ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」を服用される患者さんへ

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」は女性（閉経後）の骨粗鬆症（こつそしょうしょう）の治療に使われるお薬です。このお薬は、継続して服用することにより効果が期待されるため、必ず主治医の指示どおりに飲み続けるようにしてください。

服用時の注意

- ☑ １日１回、１錠を服用してください。時間や食事を気にする必要はありません。
- ☑ お薬はシートから取り出し、コップ１杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。
- ☑ 飲み忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く飲んでください。１日に２回飲んだり、２回分をまとめて飲んではいけません。次回からは、指示されたとおりに服用しましょう。
- ☑ 誤って多く飲んでしまった場合は、主治医または薬剤師にご相談ください。
- ☑ 主治医の指示なしに、ご自身の判断で服用をやめないでください。

～裏面もご覧ください～

次のような副作用が
あらわれることがあります。

- 顔がほてる
- 乳房がはる
- 吐き気がする
- 汗がよく出る
- 体がかゆい
- 足がつる、こむらがえりをおこす
- 静脈内に血のかたまりができてつまる（静脈血栓塞栓症）

お薬を服用後に、次のような症状に気づいたら、服用をやめてすみやかに主治医にご相談ください。

- 片方のふくらはぎが赤くはれたり、ふくらはぎを押すと痛む
- 急に息苦しく感じたり、胸苦しさを感じた
- 急に視力が低下した
- 全身のけん怠感、食欲不振、吐き気などがあらわれた

手術の後など、長期間、体を動かせない状態になる場合は、３日前までに服用を休止する必要があります。
このような場合は、事前に主治医にご相談ください。

その他、いつもとちがう症状があらわれたときは、
主治医や薬剤師にご相談ください。

GURALO01PV02
沢井製薬株式会社
2025年3月ⓓ5