

ラロキシフェン塩酸塩錠「サワイ」を 服用される患者さんへ

ラロキシフェン塩酸塩錠「サワイ」は女性（閉経後）の骨粗鬆症^{こつ そしゅうしょう}の治療に使われるお薬です。このお薬は、継続して服用することによって効果が得られますので、必ず主治医の指示どおりに飲み続けるようにしてください。

服用時の注意

- ☑ 1日1回、1錠を服用してください。
- ☑ お薬はシートから取り出し、水またはぬるま湯で飲んでください。
- ☑ 飲み忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く飲んでください。1日に2回飲んだり、2回分をまとめて飲んではいけません。次回からは、指示されたとおりに服用しましょう。
- ☑ 誤って多く飲んでしまった場合は、主治医または薬剤師にご相談ください。
- ☑ 主治医の指示なしに、ご自身の判断で服用をやめないでください。



お薬を服用後に、次のような症状に気づいたら、 主治医にご相談ください。



- 片方のふくらはぎが赤くはれたり、ふくらはぎを押すと痛む
- 急に息苦しく感じたり、胸苦しさを感じた
- 急に視力が低下した
- 全身のけん怠感、食欲不振、吐き気などがあらわれた



手術の後など、長期間、体を動かさない状態になる場合は、3日前までに服用を休止する必要があります。

このような場合は、事前に主治医にご相談ください。

その他、いつもとちがう症状があらわれたときは、
主治医や薬剤師にご相談ください。

医療機関名