

ロスバスタチン錠・OD錠「サワイ」 を服用される患者さんへ

ロスバスタチン錠・OD錠「サワイ」は、
コレステロールの合成を抑えることで
血液中のコレステロールを減らすお薬です。

このお薬の飲み方

- 1日1回、決められた量を服用します。
- コップ一杯程度の水またはぬるま湯でお飲みください。
- 飲み忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。

OD錠を服用される患者さんへ

このお薬は、口の中で速やかに溶けます

- ・ 水なしで飲むことができます。唾液を含ませ舌で軽く押しつぶして、唾液と一緒に飲みこんでください。
- ・ 普通のお薬と同じように水またはぬるま湯で飲むこともできます。
- ・ どちらの飲み方でも、効きめは変わりません。

裏面もご覧ください。

このお薬を飲むときは、以下の点にご注意ください

おうもんきんゆうかいししょう

お薬の副作用として、ごくまれに「横紋筋融解症」という筋肉の障害が起きることが知られています。次のような症状がみられましたら、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。



「横紋筋融解症」以外にも、肝臓の副作用が現れることがあります。吐き気、嘔吐、全身のだるさ、皮膚や白目が黄色くなる、などの症状がみられましたら、すぐに主治医の診察を受けてください。

いつもと違う体調の変化に気づいた場合は、
主治医・薬剤師にご相談ください。

沢井製薬株式会社